

RAPPORT LNR 4451-2001

Mengdemessig utvikling
av algebegroing
etter kalking -
årsaker og effekter

Års- og datarapport for
1998, 1999 og 2000




Foto: Stein W. Johansen

Norsk institutt for vannforskning

RAPPORT

Hovedkontor
 Postboks 173, Kjelsås
 0411 Oslo
 Telefon (47) 22 18 51 00
 Telefax (47) 22 18 52 00
 Internet: www.niva.no

Sørlandsavdelingen
 Televieen 3
 4879 Grimstad
 Telefon (47) 37 29 50 55
 Telefax (47) 37 04 45 13

Østlandsavdelingen
 Sandvikaveien 41
 2312 Ottestad
 Telefon (47) 62 57 64 00
 Telefax (47) 62 57 66 53

Vestlandsavdelingen
 Nordnesboder 5
 5008 Bergen
 Telefon (47) 55 30 22 50
 Telefax (47) 55 30 22 51

Akvaplan-NIVA A/S
 9015 Tromsø
 Telefon (47) 77 68 52 80
 Telefax (47) 77 68 05 09

Tittel Mengdemessig utvikling av algebegroing etter kalking - årsaker og effekter. Års- og datarapport for 1998, 1999 og 2000.	Løpenr. (for bestilling) 4451-2001	Dato 20.11.2001
Forfatter(e) Eli-Anne Lindstrøm Stein W. Johansen	Prosjektnr. Underrn. O-98128 E-20441	Sider Pris 59
Fagområde Forsuring/kalking	Distribusjon	
Geografisk område Sør Norge	Trykket NIVA	

Oppdragsgiver(e) Direktoratet for naturforvaltning (DN)	Oppdragsreferanse nr. 0040072
--	----------------------------------

Prosjektet "Mengdemessig utvikling av algebegroing etter kalking - årsaker og effekter" ble initiert etter at det gjennom flere år var observert uforskbarlig mye trådformede alger i mange vassdrag, både kalkede og ukalkede, på Sør- og Sørvestlandet. Prosjektet skal etablere kunnskap om mengdemessig utvikling av trådformet algebegroing før og etter kalking. Det er nå gjennomført tre års feltobservasjoner (98-00). Observasjonene er lagt til tre vassdrag; Tovdalsvassdraget, Bjerkereimsvassdraget og Suldalslågen. Algebegroingen er kartlagt fire ganger per vekstperiode, på et utvalg stasjoner oppstrøms og nedstrøms kalkede vassdragsavsnitt, ved hjelp av undervannsfotografering, biomasseprøver og kvalitative prøver.

Resultatene tilsier at den trådformede algebegroingen har høyst forskjellig forekomst, innhold og utvikling i de tre vassdragene. Det ser ut til å være større forskjeller mellom vassdragene enn det er mellom kalkede og ukalkede lokaliteter innen ett og samme vassdrag. Det ser også ut til at de ulike trådalgene har ulik evne til å etablere stor algebiomasse. Derfor vil mengden av trådalgebegroing i stor grad bestemmes av hvilke alger som trives i vassdraget. For enkelte arter, bl.a. *Zygomonium* gjør nøyosom husholdning med nitrogen og fosfor (lite næringssalter per vektenhet alge) det mulig å etablere stor algebegroing til tross for svært lite forbruk av næringssalter. Feltundersøkelsene er nå avsluttet og resultatene planlegges videre bearbeidet og rapportert som fagartikler.

Fire norske emneord	Fire engelske emneord
1. Trådformet algebegroing	1. Attached filamentous algae
2. Masseforekomst	2. Mass occurrence
3. Langtransporterte forurensinger	3. Long range transboundary pollution
4. Kalking	4. Liming

Eli-Anne Lindstrøm Anne Lyche Solheim Nils Roar Sælthun
Eli-Anne Lindstrøm *Anne Lyche Solheim* *Nils Roar Sælthun*
 Eli-Anne Lindstrøm Anne Lyche Solheim Nils Roar Sælthun
 Prosjektleder Forskningsleder Forskningsrådgiver
 ISBN 82-577-4097-7

**Mengdemessig utvikling av algebegroing
etter kalking - årsaker og effekter**

Års- og datarapport for 1998, 1999 og 2000

Forord

I denne rapporten presenteres resultatene av undersøkelser av trådformede grønnalger i noen større kalkede vassdrag på Sør- og Sørvestlandet. Rapporten gir kortfattede årsrapporter for 1998, 1999 og 2000, samt alle primærdata for samme periode. Resultatene planlegges bearbeidet videre og rapportert som fagartikler, samt en kort sluttrapport.

Undersøkelsen er gjort på oppdrag av Direktoratet for naturforvaltning (DN) i henhold til kontrakt nr. 0040072. Steinar Sandøy er kontaktperson ved DN. Undersøkelsene i Suldalslågen er delvis finansiert gjennom NIVA-prosjektet O-98131. I alle tre år har NIVA bidratt med egne forskningsmidler og finansiert analyser av total organisk karbon, fosfor og nitrogen på deler av det innsamlede algematerialet, gjennom prosjektet E-20441. I samme periode er det også innsamlet tilsvarende data fra 2 lokaliteter i Vikedalsvassdraget og Bjerkereimsvassdraget, se sammendrag 1. avsnitt.

Ved NIVA har Stein W. Johansen stått for undervannsfotografering og vært med på alt feltarbeidet. Han har også bearbeidet det innsamlede billedmaterialet og skrevet deler av rapporten. Randi Romstad har deltatt på feltarbeid og tilrettelagt algematerialet for analyse, samt analysert deler av de kvalitative algeprøvene. Alle kjemiske analyser er gjort ved NIVAs kjemilaboratorium. Undertegnede har vært saksbehandler og hovedansvarlig for rapporten.

Oslo, november 2001

Eli-Anne Lindstrøm

Innhold

1. Innledning	6
2. Metoder og materiale	7
2.1 Metoder	7
2.2 Materiale	7
3. Resultater	9
3.1 Undervannsfotografering	9
3.2 Biomasseprøver av trådalger	14
3.3 Artssammensetning - trådformede grønnalger	22
4. Litteratur	26
5. Vedlegg	27

Sammendrag

Prosjektet "Mengdemessig utvikling av algebegroing etter kalking - årsaker og effekter" ble initiert etter at det gjennom flere år var observert uforklarlig mye trådformede alger i mange vassdrag, både kalkede og ukalkede, på Sør- og Sørvestlandet. Prosjektet har som hovedmål å etablere kunnskap og dokumentasjon om mengdemessig utvikling av trådformet algebegroing før og etter kalking. De tre planlagte år med feltobservasjoner er nå gjennomført (1998-2000). Algebegroingen er kartlagt fire ganger per vekstperiode, på et utvalg stasjoner oppstrøms og nedstrøms kalkede vassdragsavsnitt, ved hjelp av undervannsfotografering, biomasseprøver og kvalitative prøver. Observasjonene er lagt til tre vassdrag; Tovdalsvassdraget, Bjerkereimsvassdraget og Suldalslågen. Det er innsamlet tilsvarende data fra to andre vassdrag, Vikedalsvassdraget og Mandalsvassdraget. Denne aktiviteten er finansiert gjennom andre prosjekter. Bare data fra vassdrag som er finansieret av dette prosjektet presenteres i denne rapporten.

Rapporten presenterer enkle årsrapporter samt primærdata fra undersøkelser i 1998, 1999 og 2000. Det gis noen sammenstillinger, av observasjoner i 1998, 1999 og 2000. Resultatene tilsier at den trådformede algebegroingen har høyst forskjellig forekomst, innhold og utvikling i de tre vassdragene. Det ser ut til å være større forskjeller mellom vassdragene enn det er mellom kalkede og ukalkede lokaliteter innen ett og samme vassdrag. De tre vassdragene har tildels ulik artssammensetning, men alle lokaliteter, også de kalkede, preges av forsuringstolerante trådalger. I Tovdal dominerer en art gjennom hele året; *Zygoonion*. I Suldal forekommer flere arter, viktigst er *Zygoonion* og *Microspora plaustris*. I Bjerkereim dominerer ulike arter på alle tre lokaliteter; *Klebsormidium rivulare*, *Zygoonion* og *Binuclearia tectorum*. Bortsett fra en mulig mindre forekomst i Suldalslågen er ingen markert forsuringsofmintlige trådalger observert. Det opptrer klare år til år forskjeller, det gjelder først og fremst mengdemessig utvikling i løpet av vekstperioden.

Det ser ut til at de ulike trådalgene har ulik evne til å etablere stor algebiomasse. *Zygoonion* ser ut til å kunne akkumulere særlig stor biomasse. Derfor vil mengden av trådalgebegroing i stor grad bestemmes av hvilke alger som trives i vassdraget. For enkelte arter gjør nøy som husholdning med nitrogen og fosfor (lite næringssalter per vektenhet alge) det mulig å etablere stor algebegroing til tross for svært lite forbruk av næringssalter. Trådalgene ser også ut til å være svært avhengige av et egnert substrat å vokse/feste seg på. Et velutviklet og stabilt mosedekke i elvebunnen ser ut til å være avgjørende i så måte. Fravær/forekomst av flommer ser også ut til å være viktig for algebegroingens mengdemessige utvikling.

1. Innledning

I de siste 20-30 årene er det rapportert om økende "grønske" (algebegroing) i en rekke vassdrag i Norge. Etter at man ble oppmerksom på fenomenet er det observert store algemengder i mange tilsynelatende upåvirkede vassdrag og det er fremsatt ulike påstander og hypoteser for å forklare fenomenet. Redusert beiting som følge av forsuring er en teori som kan forklare økningen. En annen er økt tilførsel av nitrogen som følge av økt nitrogendeposisjon. Det er også fremskaffet en del dokumentasjon som belyser ulike forhold av betydning for etablering og vekst av algebegroing (Lindstrøm m. fl. 1994, Johansen 1995, Johansen 1997, Lindstrøm 1999, Lindstrøm m. fl. 2000). Oppmerksomheten har særlig vært rettet mot rennende vann. Det ser bl.a. ut til å være spesielt gunstige betingelser for vekst av alger i norske vassdrag og det ser ut til at små endringer i vekstvilkårene kan ha store konsekvenser for hvor mye alger som produseres og akkumuleres. Kunnskapen er så langt begrenset og fragmentarisk.

En spørreundersøkelse tilsa at grønskeveksten gikk tilbake etter kalking (Lindstrøm 1993). Dette ser imidlertid ut til å være en sannhet med modifikasjoner. Det er bl.a. gjennom flere år observert store mengder trådformede grønnalger i flere kalkede vassdrag på Sør- og Sørvestlandet (DN 1997 og 1998, Kaste m. fl. 1997). Etter at man hadde observert uforklarlig store algemengder både i kalkede og ukalkede vassdrag og dessuten mottatt klager på store algemengder fra folk som nå ønsket å fiske i vassdragene, ble det søkt DN om FOU-midler til å kartlegge grønnalgeveksten.

En oppsummering av eksisterende kunnskap tilsa at det er fint lite vi vet om denne algeveksten. Det var derfor noen enkle grunnleggende målsettinger som ble satt for undersøkelsen.

- ❖ *Hovedmålsetting:* Etablere kunnskap (og dokumentasjon) om mengdemessig utvikling av trådformet algebegroing før og etter kalking
 - *Delmål:* si noe om hvor mye trådformede alger som etableres - dekningsprosent, tetthet og lengde av veksten
 - - undersøke algenes kondisjon mht. klorofyllinnhold o.l.
 - - kartlegge hvor i elva algene vokser og på hvilket substrat
 - - kartlegg hvilke arter som dominerer
 - - kartlegge utviklingen gjennom året
- ❖ *Et annet viktig mål:* Kartlegge forhold, primært kjemiske og hydrologiske, som forårsaker uønsket stor algebegroing i vassdrag da spesielt vassdrag som mottar lufttransporterte forurensninger og eventuelt kalkes som følge av dette
- ❖ *Hvis mulig:* Kartlegge den praktiske og økologiske betydningen av stor/vekslende begroing
- ❖ *Hvis mulig:* Foreslå tiltak som kan motvirke uønsket stor algebegroing i kalkede vassdrag

I første omgang konsentreres arbeidet om hovedmålsettingen, etablere kunnskap om mengdemessig utvikling av trådformet algebegroing før og etter kalking. For å oppnå den andre viktige målsettingen, kartlegge forhold som forårsaker uønsket stor algebegroing, er undersøkelsene er lagt til vassdrag der det gjøres omfattende målinger av hydrologiske og kjemiske forhold. I første fase av undersøkelsen rapporteres bare data om algebegroing, omkringdata vil trekkes inn på et senere tidspunkt.

2. Metoder og materiale

2.1 Metoder

Undervannsfotografering

For å kartlegge mengdemessig forekomst (dekningsprosent) av begroing (moser og alger) og substratforhold er det benyttet undervannsfotografering. Kamera og blitz ble påmontert en ramme med bildeareal 0,12 m². For hver stasjon ble det tatt 36-40 bilder ved hvert tidspunkt enten som transekter eller etter et tilfeldig mønster (random-foto). Summen av bildene gir et godt inntrykk av begroingsforholdene på de enkelte stasjoner.

Bildeanalyesen er utført ved å studere bildene under binokularlupe ved forstørrelse 10-40 x. Ved hjelp av et kalibrert rutenett er dekningsgraden (=horisontalprojeksjonen av forekommende begroing) av de ulike begroingselementer samt andelen bart substrat bestemt. Av begroingselementer er det skilt mellom karplanter (gras og ekte makrofytter), moser (bladmoser og levermoser) og alger (analysene er konsentrert om trådformede grønnalger).

I de tilfeller hvor det er algebegroing i mindre mengder, fremkommer substratet tydelig på bildene og en kan angi de ulike substratkategorier. I de tilfeller hvor det er massiv vekst av moser, både tøppedannende og duskformede, kan det være svært vanskelig å karakterisere substratet på bildene. I slike tilfeller er feltobservasjoner helt nødvendig som tilleggsinformasjon.

Analyser - kvantitative trådalgeprøver

Kvantitative prøver av trådformede grønnalger ble tatt ved å ta opp steiner med mose og grønnalger der grønnalgene hadde sin største forekomst, dvs. de antatt største biomassene. Det ble tatt 4 paralleller på hver stasjon. Et areal på 28,3 cm² ble stanset ut og grønnalgene ble skilt fra mosen. Prøven av grønnalger ble frysetørket, veid for tørrvektbestemmelse, homogenisert og analysert for klorofyll-a innhold etter Norsk Standard NS 4767. Tørrvekt er oppgitt som g DW m⁻², mens klorofyll-a er oppgitt som spesifikt klorofyll-a innhold, µg mg⁻¹ tørrvekt, og som mg klorofyll-a per m². For å undersøke algenes innhold av næringssalter ble prøvene også analysert for innhold av organisk karbon (TOC) og nitrogen (N) på CARLO ERBA 1106 elementanalysator og for innhold av fosfor (P) etter Norsk Standard NS 4725.

Analyser - kvalitative trådalgeprøver

For hver av de kvantitative prøvene ble det også tatt en kvalitativ prøve av grønnalgene og mosen den vokste på. Disse ble analysert i lupe og mikroskop og organismene identifisert til art eller nærmeste identifiserbare enhet. Det ble gjort en vurdering av mengdeforholdet mellom kvantitatativt viktige trådformede alger etter en skala fra 0 til 5. Var en alge fullstendig dominerende ble den gitt mengde 5. I tilfeller der flere alger hadde mengdemessig betydning ble disse til sammen angitt ved mengde 5. Trådalger uten mengdemessig betydning ble notert, men ikke angitt ved mengde, se Vedlegg 11-17.

I felt ble det også gjort notater om grønnalgeveksten: voksted i elven, substratttype, farge, trådlengde o.l., se Vedlegg 18.

2.2 Materiale

Følgende vassdrag ble valgt for undersøkelser av trådalgevekst: Tovdalsvassdraget, Bjerkereimsvassdraget og Suldalslågen. Alle har lite forurensningskilder lokalt i nedbørfeltet, men mottar mye langtransporterte forurensninger, alle kalkes og det foreligger mye data om kjemiske og hydrologiske forhold, se bl.a. Brandrud m. fl. 1998, DN 1999 og Johansen 1997.

I forbindelse med pågående undersøkelser av bl.a. begroingssamfunn og effektkjøring (Johansen 2000) og av begroingssamfunnet i et Forsknings- og referansevassdrag er det gjort tilsvarende observasjoner i to andre vassdrag i samme område; Mandals- og Vikedalsvassdraget. Det samme gjelder for disse som for de tre ovennevnte vassdrag mht. lokal forurensning, tilførsler av langtransporterte forurensninger, kalkning og data om hydrologiske og kjemiske forhold. Begge inngår dessuten i kalkingsovervåkingen (DN 2000). Materiale fra begge vassdrag er bearbeidet på samme måte som for de øvrige, men blir ikke presentert i denne års-/datarapporten.

Tabell 1 viser vassdrag og lokaliteter som inngår i trådalgeprosjektet. Her angis kartreferanse, samt en kort oversikt over status mht. kalkning, regulering og beliggenhet i forhold til innsjø. En mer omfattende karakteristikk vil bli gitt senere. Det formodes dessuten at vassdragene/lokalisitene er godt kjent, bl.a. gjennom kalkingsovervåkingen. Mandals- og Vikedalsvassdraget er med i oversikten.

Undersøkelsen startet i april 1998. For å få kunnskap om årstidsvariasjoner i trådalgeveksten ble det lagt opp til 4 prøvetakinger per år; april/mai, juni/juli, september og november. Det ble tatt alle typer prøver ved hver prøvetaking; undervannsfotografering, biomasseprøver, kvalitative prøver av biomasse og utfylling av feltskjema. Alle lokaliteter i **Tabell 1** ble prøvetatt.

Tabell 1. Vassdrag og lokaliteter for undersøkelse av trådalgevekst.

Vassdrag - lokalitet	Kart: M711	UTM: ED50 sone 32V	Kalkingsstatus	Regulering - beliggenhet
Tovdalsvassdraget				
ÅPÅ - Åpål	1512 II Mykland	458600 6510600	referanse - ukalket	uregulert - elvelokalitet
GAU - Gauslå	1512 II -- " --	464500 6493700	kalket - doserer 10 km oppstr.	uregulert - evelokalitet
Bjerkereimsvassdr.				
MAU - utløp	1212 II	338600 6512700	referanse - ukalket	regulert - 3-400 m nedstr. innsjø
Maudalsv.	Bjerkreim			
MAL - nedstrøms	1212 II -- " --	337400 6509300	kalket - doserer ca 1 km oppstr.	noe regulert - ca 1 km nedstr. innsjø
Malmei				
ØRS - utløp	1212 II -- " --	322700 6498700	kalket - innsjøkalking	uregulert - utløp innsjø
Ørsdalsvatn				
Suldalslågen				
OV2 - Suldalsosen	1313 IV Sand	358900 6596900	referanse - men noe kalket	regulert - 1.1 km nedstr. innsjø
OV10 - øvre Kvæstad	1313 IV -- " --	352300 6594000	kalket - doserer i 3 sidevassdr.	regulert - 10.1 km nedstr. innsjø
Mandalsvassdraget				
SME-Ø - Smeland oppstrøms	1412 II Åseral	410600 6503800	referanse - ukalket side av elva	regulert - utløp kraftverkstunnel
SME-N - Smeland nedstrøms	1412 II -- " --	410700 6503600	kalket - doserer 200 m oppstr.	regulert - utløp kraftverkstunnel
Vikedalsvassdraget				
VIK11 - utløp	1214 II Etne	330400 6605400	referanse - ukalket	uregulert - ca 1 km nedstrøms innsjø
Fjellgardsvatn				
VIK12 - utløp	1214 II -- " --	330500 6604600	referanse - ukalket	uregulert - ca 1 km nedstrøms innsjø
Røyrvatn				

3. Resultater

3.1 Undervannsfotografering

På alle lokaliteter er det tatt en serie undervannsfoto ved hvert tidspunkt for prøvetaking av grønnalger for analyse av artssammensetning og biomasse. Hensikten er å kvantifisere dekningen av grønnalger til forskjellig årstid, samt gi et vurderingsgrunnlag av substratttilbudet for grønnalgene. På grunn av dybdebegrensningen (fotodyp >33cm) og variabel vannføring ved de forskjellige tidspunkter, har det vært umulig å avfotografere nøyaktig de samme transekter/områder hver gang. I tillegg ble en av lokalitetene (MAU) flyttet i 1998. Disse forhold har gjort det nødvendig i første omgang å koncentrere seg om en grov bearbeiding av hver lokalitet for å illustrere likheter og forskjeller. I sluttrapporten vil en gå mer detaljert inn på veldefinerte arealer og graderinger i dyp og strømforhold.

Resultatene av bildeanalyesen i 1998, 1999 og 2000 er vist i Vedlegg 1-3. **Figur 1** viser substratforholdene mhp. mosedekning, bart substrat uten mose og dekning av karplanter for 1998-2000. I **Figur 2** er vist årstidsvariasjon i dekning av trådformede grønnalger på mose i samme periode. I det følgende kommenteres de enkelte vassdraget kort for seg. Pga. vedvarende høy vannføring og således dårlige forhold i felt senhøsten 2000, ble det ikke tatt prøver i siste periode (november) i Tovdalsvassdraget og Bjerkereimsvassdraget.

Tovdalsvassdraget.

Lok ÅPÅ (Åpål) er ukalket referanselokalitet. I 1998 hadde substratet en mosedekning vesentlig bestående av levermosen *Nardia compressa*, varierende fra 57-86% alt etter som hvor i elveprofilen bildene ble tatt. Tilsvarende var andelen bart substrat uten mose 14-43%. Klart størst mosedekning finnes i elvas midtparti hvor det sjeldent tørrlegges. Våren 1999 var det stor vannføring og umulig å komme ut til de områder en skulle fotografer. Derfor viste bildene meget stort avvik i mosedekningen. Resten av året forløp normalt. Ser en på dekningen av grønnalger på mose (**Figur 2**), var denne absolutt størst i juni (75%) og september (82%) 1998, mens det var klart minst dekning tidlig på våren i april. Denne årstidsvariasjonen gjentok seg i 1999 med unntak av september-målingen (liten dekning trolig pga. flom i forkant av prøvetaking). Det ble målt generelt lavere grønnalgedekning i 1999 enn 1998. I 2000 var det igjen høy vannføring under vårobservasjonen noe som medførte mindre mosedekning på bildene. De to neste observasjonene ble gjort under normale forhold. Utviklingen i grønnalgedekning fulgte igjen mønsteret fra 1998 med en økning frem til september (ingen novemberobservasjon grunnet flom).

Lok GAU (Gauslå) ligger ca 10 km nedstrøms kalkdosereren ved Bås. Mosedekningen varierte mellom 61 og 76% med klar dominans av *Nardia compressa* i 1998. Andelen bart substrat uten mose varierte mellom 24 og 38%. Også på denne stasjonen vil vannføringen ha betydning for hvilke områder som lar seg fotografer. En mosedekning på bare 46% på bildene våren 1999 illustrerer dette, da en pga. stor vannføring ikke kom langt nok ut i elva. I 1998 viste dekningen av grønnalger på mose et helt annet mønster enn for referansestasjonen. Både i april og juni var det tilnærmet null dekning, mens i september var en kommet opp i hele 71%. Dekningen hadde gått ned til 52% i november. I april 1999 var det tydelig at alger hadde overvintret i mosen og at disse klarte å vokse videre til en dekning på 53% i begynnelsen av juli. Deretter gikk dekningen noe ned på grunn av en markert flom i forkant av prøvetakingen i september. Grønnalgedekningen i 2000-sesongen var mye lik 1999-sesongen. Årstidsmønsteret var relativt likt med referansestasjonen både i 1999 og 2000.

Den store forskjellen i grønnalgedekning på de to stasjonene tidlig i 1998 kan ha flere årsaker. Vannføringen, drift av kalkdoserer og eventuelle effekter av anleggsarbeider oppstrøms Gauslå i 1997, er alle faktorer som må klarlegges før nærmere tolkning av resultatene.

Suldalslågen.

I Suldalslågen er begge lokalitetene kalket. OV2 ligger ca. 1,1 km nedstrøms kalkdosereren ved Suldalsosen. Plasseringen innebærer liten eller ingen påvirkning fra restfeltet til Suldalslågen mhp. vannføring. OV10 ligger ca. 10,1 km nedstrøms Suldalsosen og har større påvirkning fra restfeltet. 3 kalkdoserere i sidevassdragene Tjøstheimsåna, Steinsåna og Mosåna påvirker vannkvaliteten på denne lokaliteten.

OV2 har relativt høy mosedekning (>80%) klart dominert av levermoser, som er et meget godt substrat for grønnalger. På OV10 er også mosedekningen stor, men til forskjell fra OV2, er det på OV10 et mer variert mosesamfunn med både *Fontinalis* og *Polytrichum* i tillegg til levermose-samfunnet. Karplanter som klovasshår (*Callitrichia hamulata*) og krypsiv (*Juncus supinus*) har også større forekomster. Substratmessig vil de to stasjonene gi ulik forutsetning for grønnalgebegroing.

I 1998 viste dekningen av trådformede grønnalger samme mønster i årstidsvariasjon på begge stasjoner med en relativt høy dekning i april, et minimum i juni og en gradvis økning i september og november. Det var generelt høyere algedekning på OV2 i forhold til OV10 med unntak av juni. En av forklaringene til dette mønsteret er manøvreringen av Suldalslågen med stabil minstevannføring om vinteren, en vårflo med utsypeling av alger og deretter et relativt stabilt påslipp av vann som muliggjør ny oppbygging av grønnalgebiomasse. Minstevannføring på 12m³/s i hele vinterperioden gir mulighet for grønnalgene til å overvintrie med relativt stor biomasse til neste vekstseson.

I 1999 fikk man en gjentagelse av dette mønsteret i årstidsvariasjon i grønnalgedekning på begge stasjoner. Det var imidlertid en klar tendens til generelt lavere grønnalgedekning på sammenlignbare tidspunkter i 1999 i forhold til 1998. I 2000 var det igjen relativt høy algedekning på nivå med 1998-sesongen. Den høyeste vår-biomassen i 3-årsperioden ble målt dette året.

Bjerkereimsvassdraget.

Lok MAU er ukalket referansestasjon i dette vassdraget. Lokaliteten er noe påvirket av regulering innerst i Maudalsvatn. Selve området for undervannsfotografering ble endret i løpet av juni-september 1998 og er sammen med variabel vannføring årsaken til den forholdsvis store variasjon i mosedekning fra 31-73% dette året. Mosesamfunnet på lokaliteten er dominert av *Nardia compressa* og storvokst *Scapania*. Våren 1999 så det ut til at det hadde vært en del erosjon i mosedekket i løpet av vinteren. Utøver sommeren og høsten var mosen i god vekst slik at mosedekningen kom opp i 83% på slutten av året. I 2000 fortsatte fortettingen av mosedekket.


I 1998 hadde grønnalger på mose størst dekning i juni med 31%. Ellers var dekningen <2% ved de andre tidspunkter. Den relativt høye grønnalgedekning i juni kan ha hatt sammenheng med lokale tilslig, og det var årsaken til at stasjonensområdet ble flyttet. I 1999-sesongen var det også størst algedekning i juni med 14%. I 2000 var det som tidligere fritt for alger om våren (i mai), mens det ble registrert rekordhøy dekning i slutten av juni og september på henholdsvis 32 og 42%. En analyse av artssammensetningen i kvalitative prøver (ingen biomasseprøver, da det som vokste på mosen falt fra hverandre da det ble forsøkt innsamlet) viste stor dominans av kiselalgen *Tabellaria flocculosa*. Denne hadde også stor forekomst i juni året før. Årsaken til at de trådformede grønnalgene synes å ha dårlige vekstbetingelser på denne stasjonen er foreløpig uklar.

Lok MAL ligger nedstrøms kalkdoserer ved Malmei. Mosen som vesentlig består av *Nardia compressa* hadde en dekning på 62-77% i 1998. Tilsvarende var andelen bart substrat 23-38%. Det ble observert rester av kalk både på steiner og sedimentert i mosen, spesielt i april dette året. Det ble


observert maks grønnalgedekning på kun 1,4% i september og <0,1% ved de andre tidspunkter. I 1999 ble det igjen registrert størst grønnalgedekning i september med hele 10% og <0,1% ved de andre tidspunkter som året før. I 2000 ble det registrert en grønnalgedekning på 3,8 og 7,5% i henholdsvis juni og september. Årsaken til den generelt lave grønnalgedekningen er foreløpig uklar, men effekter av kalkingen kan være avgjørende. Det har også skjedd en viss avgang i mose på denne stasjonen som også har ført til mindre tilgjengelig substrat for grønnalgeutvikling.

Lok ØRS ligger i utløpet av Ørsdalsvatn som ble kalket i mars 1997 og juli 1999. Lokaliteten har en mosedekning på >90% der det fotograferes. På dyp <33 cm kan mosedekningen være betydelig mindre ved normal til høy vannføring. De dominerende mosearter er *Hygrohypnum ochraceum* og *Nardia compressa*. Til tross for den høye mosedekningen, ble det observert liten dekning av trådformede grønnalger ved alle 4 tidspunkter (<4% dekning) i 1998. Også i 1999-sesongen ble det observert liten dekning av trådformede grønnalger ved alle 4 tidspunkter (<3% dekning). I 2000 ble det registrert noe økt grønnalgedekning i forhold til tidligere år, spesielt i mai, men også i september. En dekning på 7,8% i mai 2000 er trolig et resultat av at observasjonen er gjort ved en ugunstig høy vannføring slik at nye arealer i forhold til tidligere er registrert. En mosedekning på bare 61% viser dette.

På denne lokaliteten opptrer såkalte "algefiltmatter" i perioder. Disse danner belegg på steiner og moser og synes å være en komplisert matrix av bl.a. trådformede cyanobakterier. Innimellom belegget kan det også være rene bestander av cyanobakterier spesielt på mose, og disse kan være vanskelige å skille fra belegget. Årsaksforholdene og variasjonene omkring algefiltmattene er ikke klarlagt, men det kan se ut til at forekomsten øker etter kalking. Det har også vært antydet at de kan okkupere plassen og dermed hindre grønnalgeutviklingen. Algefiltmattene hadde stor forekomst i 1998 og ble sterkt redusert i omfang i løpet av vinteren 1999 og videre utover i sesongen. I 2000-sesongen var det igjen en økning i forekomst av algefiltmattene.



Figur 1. Prosent dekning av bart substrat (uten mose), moser og karplanter (vesentlig klovasshår og krypsiv i Suldalslågen) i 1998, 1999 og 2000 basert på undervannsfotografering. Data for periode 00-4 mangler for Tovdals- og Bjerkereimsvassdraget pga. flom.



Figur 2. Prosent dekning av trådformede grønnalger på mose i 1998, 1999 og 2000 basert på under-vannsfotografering. (På noen tidspunkt på lok. MAU var kiselalgen *Tabellaria flocculosa* et dominerende element i forhold til trådformede grønnalger.) Data for periode 00-4 mangler for Tovdals- og Bjerkereimsvassdraget pga. flom.

3.2 Biomasseprøver av trådalger

Vedlegg 4-10 viser primærdata av tørrvektsmålinger og kjemiske analyser av biomasseprøver tatt av trådformede grønnalger i 1998, 1999 og 2000. I 2000 er bare deler av det innsamlede algematerialet analysert for innhold av totP, totN og TOC (organisk karbon). **Vedleggene vil bli oppdatert når alle resultatene fra 2000 foreligger.**

Biomassen kan måles på minst tre måter:

1. som tørrvekt per arealenhet
2. som mengde klorofyll-*a* per vektenhet - her kalt spesifikt klorofyllinnhold.
3. som produkt av 1 og 2 - klorofyll per arealenhet

Tørrvekt per arealenhet er et noe konservativt mål som gir uttrykk for hvor mye materiale som er akkumulert gjennom et gitt tidsrom.

Spesifikt klorofyllinnhold er et dynamisk og variabelt mål. Det kan endres raskt og er bl.a. avhengig av næringstilførslene. Lyset virker også inn på klorofylletettheten. Algecellene vil økonomisere energi- og stoffforbruket og ikke lage mer klorofyll enn det er behov for under de gitte betingelser

Klorofyll per arealenhet er produktet av de to foregående og vil ha i seg både et konservativt og et dynamisk mål på biomassen. Dette er et mye brukt biomassemål.

I **Figur 3**, **Figur 4** og **Figur 5** presenteres henholdsvis tørrvekt (DW) per arealenhet (g m^{-2}), spesifikt klorofyll-*a* innhold (mg g^{-1}) og klorofyll-*a* per arealenhet (mg m^{-2}) ved fire tidspunkter i 1998, 1999 og 2000. Resultatene er presentert som snitt av 4 parallelle målinger.

Tørrvekt

Figur 3 viser at det var store forskjeller mellom vassdragene, det gjaldt såvel årstidsvariasjoner som maksimal akkumulert tørrvekt. Utviklingen av mengde tørrvekt i biomasseprøvene fulgte stort sett utviklingen av dekningsprosent av alger, men ikke alltid (se undervannsfotografering).

I 1998 så det ut til å foregå en jevn oppbygging av biomassen i Tovdalsvassdraget, med økende tørrvekt per prøve fra april til november. Oppbygningen startet senere på den kalkede lokaliteten GAU (Gauslå) og var generelt mindre enn på referanselokaliteten ÅPÅ (Åpål). I 1999 var biomassen mer jevnt fordelt over året, uten det markerte maksimum som ble observert i november 1998. Dette hadde trolig sammenheng med en kraftig flom tidligere på høsten. År 2000 fulgte stort sett foregående år med jevn oppbygging av biomassen fra vår til tidlig høst. På grunn av den store flommen høsten 2000 var det umulig å ta biomasseprøver i november. Bortsett fra i 1998, da Åpål hadde noe høyere tørrvektverdier enn Gauslå, var det ikke store forskjeller i biomasse mellom ukalket (ÅPÅ) og kalket (GAU) lokalitet.

Suldalslågen viste en annen sesongvariasjon enn i Tovdal, her hadde biomasseprøvene generelt størst tørrvekt tidlig på våren. Det gjelder særlig stasjon OV2 rett nedstrøms Suldalsvatn, som er sterkere influert av reguleringen enn stasjon OV10 (øvre Kvæstad). Biomassen oppnår ikke like stor tørrvekt som i Tovdalsvassdraget, til tross for at dekningsprosent av alger (især på OV2 - se undervannsfoto) er nesten like stor som i Tovdalsvassdraget i september-november. Algebiomassen hadde generelt mindre tørrvekt i 1999 enn i 1998, mens 2000 var omrent som 1998. Store forskjeller i algebiomasse fra år til år ser det ikke ut til å være.

Biomasseprøver fra Bjerkereimsvassdraget (MAU, MAL, ØRS) har generelt mindre tørrvekt enn prøver fra Tovdal og Suldalslågen. Oppbygging av biomasse ser dessuten ut til å foregå i korte perioder og til helt ulike tidspunkt på de tre lokalitetene. Ved flere av prøvetakningene var det ingen

trådalger å ta prøver av. Det er tidligere rapportert om tildels meget stor og svært varierende forekomst av trådformede grønnalger i Bjerkereimsvassdraget fra år til år (DN 1998).

Spesifikt klorofyll-a innhold

Klorofyll-a innholdet i trådalgene varierte og så stort sett ut til å øke i løpet av vekstsesongen, **Figur 4**. Økningen er bl.a. en kompensasjon for avtakende lys sent i vekstperioden. Sammenliknet med målinger av andre begroingsalger var klorofyll-a innhold i disse trådalgene ganske høyt (Lindstrøm m. fl. 1994). Prøver fra Bjerkereimsvassdraget varierte mer enn prøver fra Tovdal og Suldal. Disse to vassdragene så dessuten ut til å ha omtrent samme klorofyllinnhold i algeprøver fra samme tidspunkt. Prøver fra MAU (utløp Maudalsvatn i Bjerkereim) viste særlig stor variasjon i klorofyllinnholdet med maksimalt høye verdier i september og november 1999, chl-a over 13 mg g^{-1} . Eventuelle artsavhengige forskjeller i klorofyllinnholdet i algebegroingen vil ikke bli kommentert i denne første fase av rapporteringen.

Klorofyll-a per arealenhet

På grunn av ulik oppbygging av biomasse i løpet av vekstperioden (målt som tørrvekt per arealenhet) kan mengde klorofyll per arealenhet bli svært forskjellig selv om det spesifikke klorofyllinnholdet i sammenliknbare prøver (samlet på samme tidspunkt) er ganske likt. Tovdal og Suldal har helt ulike mønster i oppbygging av biomasse (målt som tørrvekt pr arealenhet) i løpet av vekstperioden. Biomassen er dessuten generelt høyere i Tovdal enn i Suldal. Nivå og variasjon i spesifikt klorofyllinnhold var imidlertid ganske likt i de 2 vassdragene. Det skulle tilsi at ulike forhold styrer de 2 variablene og at de bør vurderes hver for seg.

Velger en allikevel å vurdere klorofyll per arealenhet, **Figur 5**, ser en at dataene viser stor spredning, med en klar tendens til økende verdier i løpet av vekstperioden. Selv om tørrvektverdiene som regel er høyest om våren før flom/påslipp av vann fra Suldalsvatn har Suldal maksverdier for klorofyll per arealenhet sent i vekstperioden. Det skyldes økende spesifikt klorofyllinnhold sent i vekstperioden. Generelt sett er det mest klorofyll per arealenhet i Tovdalsvassdraget. Bjerkereimvassdraget har lavest verdier og de varierer mest.

Elementinnhold i algeprøvene

Det har lenge vært kjent at alger som vokser under optimale forhold med hensyn til næringstilgang og ellers har gode vekstbetingelser, vanligvis har et gitt forhold mellom innhold av elementært organisk karbon, nitrogen og fosfor. Dette forholdet C:N:P er kjent som Redfield-forholdet og skal i følge teorien være 41,1:7,2:1, regnet på vektbasis (Redfield 1958). Det omvendte forholdet (P:N:C - uttrykker innholdet av næringssalter direkte) skal være 0,024:0,139:1. Av ulike årsaker vil dette forholdet variere. I tillegg til næringstilgangen innvirker lys, temperatur, algenes alder, stadium i vekstfasen, årstidsvariasjoner og variasjoner mellom ulike alger. Markerte avvik/endringer vil vanligvis være et uttrykk for ubalanse i næringstilførselen eller næringsbegrensning. Målinger av elementinnhold i algebiomasse samlet ute i naturen viser at innholdet av nitrogen og særlig fosfor i forhold til organisk karbon vanligvis er noe lavere enn teorien tilsier (Lindstrøm .m fl. 1994, Lindstrøm 1996, Dahl-Hansen m. fl. 1998, Kahlert 1998, Hillebrand & Sommer 1999).


Et P:C forhold mellom 0,005-0,010 er ikke helt uvanlig i algebiomasse som har vokst i næringsfattig, primært fosforbegrenset vann. Målinger av elementinnhold i algeprøvene vil ikke bli kommentert i detalj på det nåværende tidspunkt. Noen forhold er imidlertid så spesielle at de bør omtales.

Figur 6 viser forholdet mellom fosfor (P) og organisk karbon (C). Algemateriale fra alle undersøkte lokaliteter i 1998 og 1999 hadde betydelig lavere P:C forhold enn teorien tilsier (0,024). Lavest var forholdet i Tovdalsvassdraget der snitt for alle prøver var under 0,0007. Septemberprøver fra Åpål i 1998 hadde særlig lavt forhold, under 0,0005. Dette er betydelig lavere enn vi har målt tidligere i algebegroing som har vokst ute i naturen. Vi har heller ikke funnet litteratur som viser til algemateriale


med så lite innhold av fosfor i forhold til organisk karbon. Vårprøvene fra Åpål i 1999 hadde høyere P innhold enn alle de øvrige prøvene fra denne lokaliteten. En sannsynlig forklaring på dette er artsinnholdet, som for disse prøvene var helt uvanlig for denne lokaliteten, se **Figur 8**. I Suldalslågen hadde stasjonen lengst ned i vassdraget OV10 noe høyere P:C forhold enn i Tovdal, i snitt ca 0,0025, men også dette er klart lavere enn vanlig. Ved alle målinger i 1998 og 1999 hadde trådalger fra denne stasjonen høyere innhold av fosfor enn oppstrøms ved utløp av Suldalsvatn, stasjon OV2. Den eneste lokaliteten som hadde algemateriale med et fosforinnhold opp mot det man vanligvis finner i næringsfattige vassdrag var referansestasjonen i Bjerkreimsvassdraget ved utløp av Maudalsvatn, MAU. Her var P:C i snitt ca 0,004.

Hva algematerialets usedvanlig lave fosforinnhold betyr er absolutt ikke klart, men det *kan* se ut til at det i disse vassdragene er mulig å bygge opp stor algebiomasse selv om fosfortilgangen er svært liten. Det betyr dessuten at det ikke nødvendigvis bindes mer P i algebegroingen i vassdrag med stor biomasse enn i vassdrag med liten.


En tilsvarende framstilling av algebegroingens nitrogeninnhold i forhold til organisk karbon (i følge teorien skal N:C forholdet være 0,14.) er gitt i **Figur 7**. Forholdet er generelt noe lavere enn det teoretiske, men holder seg stort sett over det en regner som nitrogenbegrenset 0,06-0,07. Som for fosfor er det alger fra Tovdalsvassdraget og øvre stasjon i Suldal (OV2) som har det laveste nitrogeninnholdet. Her er det så lavt at man normalt ville omtalt disse som nitrogenbegrenset. Som for fosfor skiller vårprøven fra Åpål (Tovdal) i 1999 seg ut med høyt innhold av nitrogen. Artsspesifikke forskjeller er (som omtalt under fosfor) en sannsynlig forklaring på dette. Det er også (som for fosfor) forskjell mellom øvre (OV2) og nedre (OV10) lokalitet i Suldal med høyest nitrogeninnhold på den nedre.




Figur 3. Tørrvekt (DW g m⁻²) av trådformede grønnalger i biomasseprøver samlet på 4 tidspunkt i 1998, 1999 og 2000. Ingen prøver fra Tovdal og Bjerkereim 00-4 på grunn av flom. NB! Ulik skala i figurer fra ulike vassdrag.




Figur 4. Spesifikt klorofyllinnhold ($\text{chl-}a \text{ mg g}^{-1}$) i trådformede grønnalger samlet på 4 tidspunkt i 1998, 1999 og 2000. Ingen prøver fra Tovdal og Bjerkereim 00-4 på grunn av flom. NB! Ulik skala i figuren fra MAU - utløp Maudalsvatn.



Figur 5. Klorofyll (chl a mg m $^{-2}$) i prøver av trådformede grønnalger samlet på 4 tidspunkt i 1998, 1999 og 2000. Ingen prøver fra Tovdal og Bjerkereim 00-4 på grunn av flom. *NB!* Ulik skala i figurer fra ulike vassdrag.



Figur 6. Forholdet mellom total fosfor (TP) og organisk karbon (TOC) i biomasseprøver samlet på 4 tidspunkt i 1998 og 1999.



Figur 7. Forholdet mellom total nitrogen (TN) og organisk karbon (TOC) i biomasseprøver samlet på 4 tidspunkt i 1998 og 1999.

3.3 Artssammensetning - trådformede alger


Vedlegg 11-17 viser primærdata av de kvalitative algeundersøkelsene i 1998, 1999 og 2000. **Figur 8**, **Figur 9** og **Figur 10** viser mengdeforholdet mellom dominerende trådalger i samme periode. En del av de trådformede grønnalgene må være fertile for å identifiseres. Det er de sjeldne, disse er derfor angitt ved en arbeidsbetegnelse i vedleggene. Organismene er dessuten angitt ved koder, ikke ved fullt navn.

På den ene side viser vassdragene stor innbyrdes likhet. Artsinnholdet i trådalgesamfunnet er i det store og hele ganske likt i alle vassdrag og består totalt sett av et begrenset antall forsuringstolerante arter. På den annen side er det klare forskjeller. Alle vassdrag er *dominert* av forskjellige arter og det er som oftest en og samme art som dominerer gjennom hele vekstperioden.


I Tovdalsvassdraget (**Figur 8**) der den forsuringsbegunstigede *Zygogonium* sp3 (17-24 μ m) dominerer totalt, er mangelen på variasjon særlig utpreget. På referanselokaliteten ved Åpål var det et mindre innslag av *Binuclearia tectorum* tidlig på året i 1998. På den kalkede lokaliteten ved Gauslå ble denne ikke observert. *Binuclearia* så for øvrig ikke ut til å trives på noen av de kalkede lokalitetene. Bortsett fra ulikt innslag av *Binuclearia* ser det trådformede algesamfunnet ut til å være svært likt på stasjonene oppstrøms (Åpål) og nedstrøms (Gauslå) kalking. I 1999 ble vårprøvene (99-1) på Åpål tatt under vanskelige forhold. Vannføringen var høy og prøvene ble tatt nærmere land enn vanlig, i periodisk tørrlagt område. Det er trolig grunnen til at artsinnholdet i disse prøvene var helt annerledes enn normalt for Åpål, se **Figur 8**.

I Suldalslågen (**Figur 9**) dominerer en "nær slekting" av *Zygogonium*-arten i Tovdal. Den er foreløpig betegnet *Zygogonium* sp4 og er muligens samme art som i Tovdal. Denne er ikke like enerådende som i Tovdalsvassdraget og hadde selskap av 2-3 andre forsuringstolerante trådalger gjennom hele vekstperioden i 1998, 1999 og 2000; bl.a. *Klebshormidium rivulare*, *Microspora plaustris* og slekten *Bulbochaete*.


Selv om algebiomassen i Bjerkreimsvassdraget var for liten til å samle kvantitative prøver ble det ved de fleste prøvetakinger tatt kvalitative algeprøver, **Figur 10**. Her dominerer en tredje art, *Klebshormidium rivulare*, på alle tre lokaliteter. Vanligvis opptrer den sammen med en eller flere andre arter. I 1999 kom det nytt innslag av trådformede alger i utløp av Ørsdalsvatnet. Det gjaldt den forsuringsbegunstigede *Zygogonium* som kom inn som et markert element i høstprøvene fra 1999. Dette er så langt vi har observert, den eneste lokalitetet der det har vært en endring i artsammensetningen i løpet av observasjonsperioden (1998-2000). Markert forekomst av *Zygogonium* sammenfalt med avtakende næringsinnhold i algebiomassen (P:C og N:C-forhold).



Figur 8. Mengdeforhold (0-5) mellom kvantitativt viktige trådformede grønnalger i Tovdalsvassdraget 1998, 1999 og 2000. 1=april/mai, 2=juni/juli, 3=september, 4=november. *: Ingen vekst på GAU (Gauslå) i april 1998.



Figur 9. Mengdeforhold (0-5) mellom kvantitativt viktige trådformede grønnalger i Suldalslågen 1998, 1999 og 2000. 1=april/mai, 2=juni/juli, 3=september, 4=november.



Figur 10. Mengdeforhold (0-5) mellom kvantitativt viktige trådformede grønnalger i Bjerkereimsvassdraget 1998, 1999 og 2000. 1=april/mai, 2=juni/juli, 3=september, 4=november.

4. Litteratur

- Brandrød, T.E., Halvorsen, G., Raddum, G., Brettum, P., Dolmen, D., Halvorsen, G.A., Lindstrøm, E-A., Schnell, Ø., Sloreid, S.E., Walseng, B. 1999. Effekter av kalkning på biologisk mangfold. Basisundersøkelser i Tovdalsvassdraget 1995-96.
- Dahl-Hansen, G.A., Brettum, P., Lindstrøm, E-A., Mjelde, M., Nygaard, K., Primicerio, R., Solheim, A.L., Aanes, K.J., Berge, D. 1998 Limnoccult - 97. Fase II: Effekter etter ett år med næringssaltanrikning av et næringsfattig røyevassdrag. 105 sider.
- DN 1998. Kalking av vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1997. DN-notat 1998-3.
- DN 1999. Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1998. D-notat 1999-4. 536 sider.
- Hillebrand, H. & Sommer, U. 1999. The nutrient stoichiometry of benthic miroalgal growth: redfield proportions are optional. Limnol. Oceanogr. 44(2): 440-446.
- Johansen, S.W. 1995. Mose og algebegroing. Flompåvirkning og gjengroing etter rensing. Lakseforsterkningsprosjektet i Suldalslågen. Rapp. 15.
- Johansen, S.W. 1997. Begroingsundersøkelser i Suldalslågen, tidsutvikling, effekter av tiltak og utspylting av organisk materiale., fase II. Rapp.37.
- Johansen, S.W. 2000. Konsekvenser av effektkjøring på økosystemer i rennende vann. Effekter på ulike begroingssamfunn. Norsk institutt for vannforskning (NIVA). L.nr. 4322-2000.
- Kahlert, M. 1998. C:N:P ratios of freshwater benthic algae. Arch. Hydrobiol. Spec. Issues Advanc. Limnol. 51: 105-114.
- Kaste, Ø., Lindstrøm, E-A., Skiple, A., Aanes, K.J. Otra 1996. Tiltaksorientert overvåking og konsekvensundersøkelse av utslipp. Norsk institutt for vannforskning, NIVA, rapp. 3683-97.
- Lindstrøm, E-A. 1993. Økende grønske i norske vassdrag. Resultater av en spørreundersøkelse. Norsk institutt for vannforskning (NIVA). E-92432. 28 sider.
- Lindstrøm, E-A. 1996. The Humic Lake Acidification Experiment (HUMEX): Impacts of acid treatment on periphyton growth and nutrient availability in Lake Skjevatjern, Norway. Environ. Int. 22: 629-642.
- Lindstrøm, E-A. 1999. Tålegrenser i fjellområder - hva betyr langtransporterte forurensninger for fastsittende algesamfunn? I, Heriksen, A. (red.), Tålegrenser i fjellområder. Hva vet vi og hva bør vi vite? Naturens tålegrenser, Farrapport nr. 101. Norsk institutt for vannforskning, NIVA. L.nr. 4017-99. 88 sider.
- Lindstrøm, E-A., Johansen, S.W. & Bremnes, T. 1994. Ekspimetelle undersøkelser for kontroll av begroing i regulerte vassdrag. Sluttrapport. Norsk institutt for vannforskning, NIVA. R.nr. 3086-94. 150 sider.
- Lindstrøm, E-A., Wright, D. & Kjellberg, G. 2000. Tålegrensen for nitrogen som næringsstoff i norske fjellvann: økt "grønske"? Norsk institutt for vannforskning (NIVA). L.nr.4187-2000. 39 sider.
- Grøstad, M & Fagerlund, K.H. 1999. Forskref - Forsknings- og referansevassdrag Atna og Vikedal. Årsrapport 1996. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. 99-1. 160 sider.
- Redfield, A.C. 1958. The biological control of chemical factors in the environment. American Scientist, 46: 205-221.

5. Vedlegg

Vedlegg 1. Resultater av bildeanalyse. % dekning av ulike begroingselementer samt kategorier av bart substrat. Middelverdier av N bilder ved hvert tidspunkt i 1998.

stasjon	dato	N	dyp cm	mose Font.	mose Poly.	mose lever	total moser	alger grønn	alger filt	karpel Call.	karpel Junc.	stein	grus	sand
OV2	15.04	36	66	0	0,14	94	94,1	54,7	0	0,01	0,02	5,84	0	0
OV2	26.06	39	69	0,01	0,08	80,3	80,4	0,66	0	0,01	1,67	16,5	1,39	0
OV2	21.09	39	67	0,02	0,22	84,9	85,1	56,7	0	0,01	0,93	12,5	1,31	0,08
OV2	19.11	39	68	0,05	0,00	83	83,1	82,4	0	0	0,93	15,8	0,22	0
OV10	16.04	38	62	13,8	1,15	61,8	76,7	35,2	0	5,79	2,75	9,79	4,98	0
OV10	25.06	39	76	14,2	1,53	74,4	90,2	4,02	0	1,98	0,01	6,88	0,56	0,34
OV10	22.09	39	43	10,8	1,09	79	90,8	16,7	0	4,58	0,04	3,34	0,36	0,83
OV10	19.11	38	74	7,56	3,14	66,4	77,1	28,8	0	11,2	2,3	8,02	0,72	0,67
ÅPÅ	22.04	38	59	0	0,43	56,4	56,8	21,1	0	0	0,06	40,4	2,66	0,04
ÅPÅ	22.06	36	51	0	0,16	81,8	82	75,3	0	0	0,02	15,7	2,19	0,13
ÅPÅ	31.08	39	46	0	0,07	85,9	86	82,1	0	0	0,03	11,8	2,19	0
ÅPÅ	16.11	36	51	0	0,34	71,3	71,6	38	0	0	0,01	25,1	3,29	0
GAU	22.04	39	62	0	0,03	61,1	61,1	0,01	-	0	0,87	36,3	1,73	0,05
GAU	22.06	36	41	0	0,06	72,8	72,8	1,11	-	0	0,26	26,1	0,82	0
GAU	02.09	37	35	0	0	76	76	71,5	-	0	0,31	23,5	0,17	0
GAU	16.11	38	43	0	0	73,1	73,1	52	-	0	0,89	24,9	0,93	0,17
ØRS	23.04	39	52	0	0,00	-	95,3	1,53	29	0	0	3,94	0,71	0
ØRS	23.06	39	52	0	0,01	-	98,7	2,71	43	0	0	0,98	0,3	0
ØRS	27.08	39	54	0	0	-	91,9	1,49	34	0	0	7,77	0,29	0
ØRS	18.11	39	45	0	0	-	98	3,64	18	0	0	0,94	1,08	0
MAL	23.04	38	57	0	0	65,9	65,9	0,02	0	0	0,02	33,9	0,17	0
MAL	23.06	39	53	0	0	77,3	77,3	0,12	0	0	0,04	22,5	0,2	0
MAL	27.08	39	58	0	0	77	44	1,4	0	0	0,03	22,9	0,12	0
MAL	17.11	38	52	0	0	62,2	62,2	0,04	0	0	0,06	37,6	0,22	0
MAU	23.04	39	49	0	0	31,1	31,1	1,95	0	0	0	66,8	2,06	0
MAU	23.06	39	40	0	0	72,9	72,9	31,4	0	0	0	26,2	0,82	0,14
MAU	27.08	39	45	0	0	54,2	54,2	0,06	0	0	0	42,1	3,73	0
MAU	17.11	29	47	0	0	73,3	73,3	0,87	0	0	0	24,4	2,31	0

Font.=*Fontinalis dalecarlica* og *F. antipyretica*, Poly.=*Polytrichum commune*, Call.=*Callitrichia hamulata*, Junc.=*Juncus supinus*. Levermoser kan være et samfunn bestående av en eller flere av artene *Nardia compressa*, *Scapania undulata* og *Marsupella aquatica*.

Vedlegg 2. Resultater av bildeanalyse. % dekning av ulike begroingselementer samt kategorier av bart substrat. Middelverdier av N bilder ved hvert tidspunkt i 1999.

stasjon	dato	N	dyp cm	mose Font.	mose Poly.	mose lever	total moser	alger grønn	alger filt	karpel Call.	karpel Junc.	stein	grus	sand
OV2	15.04	39	59	0,01	0	81,8	81,9	44,8	0	0,05	0,97	16,2	0,88	0,08
OV2	28.06	39	67	0	0,03	62	62,1	0,06	0	0,01	1,79	33,6	2,23	0,26
OV2	21.09	39	66	0,04	0,11	75	75,2	17,1	0	0,02	1,97	21,9	0,81	0,12
OV2	18.11	39	67	0	0	76,5	76,5	76	0	0,01	0,74	21,7	0,99	0
OV10	14.04	36	71	7,83	1,89	64,1	73,8	33,1	0	11,4	3,12	7,99	1,99	1,74
OV10	28.06	39	69	14,3	0,76	46,8	61,8	0,05	0	1,6	0,01	36	0,09	0,47
OV10	22.09	38	64	9,65	0,56	49,7	59,9	3,42	0	1,05	0,01	38,8	0,16	0,13
OV10	17.11	38	71	6,7	1,94	60,3	69	19,3	0	13,2	7,11	8,06	1,57	1,19
ÅPÅ	05.05	39	53	0	0	5,34	5,34	1,03	0	0	0,1	92,8	1,55	0
ÅPÅ	07.07	35	54	0	0,32	82,4	82,7	62,3	0	0	0,01	15,8	1,46	0
ÅPÅ	07.09	34	48	0	0,47	73,6	74,1	42,3	0	0	0,03	22,7	3,24	0
ÅPÅ	15.11	36	58	0	0,25	66,7	67	21,4	0	0	0,01	29	4,04	0
GAU	05.05	38	64	0	0	46,2	46,2	7,93	-	0	1,54	49,9	1,53	0,77
GAU	07.07	39	53	0	0	69,2	69,3	53	-	0	1,09	28,8	0,75	0,13
GAU	06.09	34	38	0	0,02	68	68	44,9	-	0	0,74	30	1,12	0,13
GAU	15.11	39	46	0	0,07	58,1	58,2	30,9	-	0	1,7	38,4	1,59	0,16
ØRS	06.05	39	66	0	0	-	86,8	1,25	4,17	0	0	12	1,18	0
ØRS	30.06	39	64	0	0	-	89,5	2,41	2,97	0	0	10,3	0,23	0
ØRS	10.09	39	49	0	0,01	-	93,4	0,56	1,41	0	0	6,11	0,49	0
ØRS	16.11	32	44	0	0,03	-	93,5	0,51	1,1	0	0	6,27	0,19	0
MAL	06.05	39	57	0	0	57,2	57,2	0	0	0	0,07	42	0,64	0
MAL	30.06	38	55	0	0	67,3	67,3	0,06	0	0	0,11	32,4	0,18	0
MAL	10.09	39	54	0	0	80,9	80,9	10,3	0	0	0,11	19	0,03	0
MAL	16.11	39	52	0	0	65,2	65,2	0,01	0	0	0,06	34,4	0,29	0
MAU	06.05	38	50	0	0	44,5	44,5	0,01	0	0	0,01	53,4	2,08	0
MAU	30.06	37	48	0	0	67,8	67,8	13,9	0	0	0	29,7	2,45	0
MAU	10.09	39	47	0	0	75,3	75,3	0,02	0	0	0,01	21,6	3,06	0
MAU	16.11	37	52	0	0	83,3	83,3	4,62	0	0	0	15,2	1,47	0

Font.=*Fontinalis dalecarlica* og *F. antipyretica*, Poly.=*Polytrichum commune*, Call.=*Callitrichia hamulata*, Junc.=*Juncus supinus*. Levermoser kan være et samfunn bestående av en eller flere av artene *Nardia compressa*, *Scapania undulata* og *Marsupella aquatica*.

Vedlegg 3. Resultater av bildeanalyse. % dekning av ulike begroingselementer samt kategorier av bart substrat. Middelverdier av N bilder ved hvert tidspunkt i 2000.

stasjon	dato	N	dyp cm	mose Font.	mose Poly.	mose lever	total moser	alger grønn	alger filt	karpel Call.	karpel Junc.	stein	grus	sand
OV2	13/04	39	60	0	0.01	84.7	84.7	66	0	0.01	0.01	15.1	0.2	0
OV2	29/06	39	69	0	0.11	70.3	70.4	1.7	0	0.02	0.23	26.2	2.9	0.19
OV2	20/09	39	68	0	0.04	84.8	84.8	72	0	0.02	2.26	12	0.7	0.17
OV2	23/11	39	60	0	0.01	87.9	87.9	84.1	0	0.07	0.01	11.7	0.3	0
OV10	13/04	39	68	9.26	2.16	68.8	80.2	53.6	0	7.27	0.75	6.63	3.2	1.96
OV10	29/06	32	72	12.9	1.17	53.4	67.5	1.9	0	1.07	0.83	29.4	0.2	1.01
OV10	19/09	38	57	12.8	0.15	57.4	70.3	22	0	2.05	1.18	25.8	0	0.63
OV10	23/11	38	76	10.4	1.82	57.1	69.4	15.8	0	13.4	3.03	11.3	2.6	0.32
ÅPÅ	18/05	35	50	0	0.02	46.8	46.8	19.9	0	0	0.05	51.3	1.8	0
ÅPÅ	26/06	39	58	0	0.08	81.1	81.2	59.8	0	0	0.01	18	0.7	0.1
ÅPÅ	29/08	38	54	0	0.23	83.9	84.1	74.7	0	0	0.01	15.1	0.8	0
ÅPÅ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GAU	18/05	39	53	0	0.01	65.9	65.9	8.6	-	0	1.09	32.1	0.9	0
GAU	26/06	39	49	0	0	77.7	77.7	59.5	-	0	1.44	20.6	0.2	0
GAU	28/08	36	43	0	0.02	76.2	76.2	49.6	-	0	2.17	21.2	0.5	0
GAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ØRS	19/05	39	68	0	0	-	61.3	7.8	13.2	0	0	38.3	0.4	0
ØRS	27/06	39	63	0	0	-	92.2	2.8	13.7	0	0	7.57	0.2	0
ØRS	01/09	39	58	0	0	-	94.3	7.6	27.2	0	0	5.42	0.3	0
ØRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAL	19/05	38	61	0	0	45.9	45.9	0	0	0	0.04	53.8	0.3	0
MAL	27/06	39	60	0	0	52	52	3.8	0	0	0.05	47.7	0.3	0
MAL	01/09	38	54	0	0	64.3	64.3	7.5	0	0	0	35.7	0.1	0
MAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAU	19/05	39	60	0	0	72.1	72.1	0	0	0	0	27.2	0.7	0
MAU	27/06	39	45	0	0	92.1	92.1	31.5	0	0	0	7.04	0.8	0
MAU	01/09	39	41	0	0	89.6	89.6	42.2	0	0	0	9.47	1	0
MAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Font.=*Fontinalis dalecarlica* og *F. antipyretica*, Poly.=*Polytrichum commune*, Call.=*Callitrichia hamulata*, Junc.=*Juncus supinus*.

Levermoser kan være et samfunn bestående av en eller flere av artene *Nardia compressa*, *Scapania undulata* og *Marsupella aquatica*.

"Alger filt" er et belegg på stein og moser som består av en matrix med bl.a. ulike cyanobakterier m.m.

Vedlegg 4. Biomasseprøver av trådalger - Tovdalsvassdraget ved ÅPÅ (Åpål) 1998-2000.
1998:

Lok	År	Periode	Prøve	Dato	DW g	DW g m ⁻²	Chla mg g ⁻¹	Chla mg m ⁻²	Tot-P µg/g TS	Tot-N µg/mg TS	TOC µg/mg TS	TN/TP	TOC/TP	TOC/TN
ÅPÅ	1	1	S1	980422	0,1343	47,4558	1,25	59,3	442	32,7	338	74,0	765	10,3
ÅPÅ	1	1	S2	980422	0,0201	7,1025	0,90	6,4	*	24,6	294			12,0
ÅPÅ	1	1	S3	980422	0,0429	15,1590	0,75	11,4	305	21,1	292	69,2	957	13,8
ÅPÅ	1	1	S4	980422	0,0399	14,0989	0,33	4,7	214	23,7	266	110,7	1243	11,2
ÅPÅ	1	98-1	S1-S4		0,0593	20,9541	0,81	20,4	320	25,5	298	84,6	988	11,8
ÅPÅ	1	1	S5	980422	0,3279	115,8657	0,38	44,0	194	18,4	164	94,8	845	8,9
ÅPÅ	1	1	S6	980422	0,2793	98,6926	0,27	26,6	174	19,4	169	111,5	971	8,7
ÅPÅ	1	2	S1	980622	0,2841	100,3887	2,48	249,0	178	20,3	322	114,0	1809	15,9
ÅPÅ	1	2	S2	980622	0,3192	112,7915	2,51	283,1	194	21,5	344	110,8	1773	16,0
ÅPÅ	1	2	S3	980622	0,3655	129,1519	2,89	373,2	306	21,9	355	71,6	1160	16,2
ÅPÅ	1	2	S4	980622	0,3336	117,8799	3,67	432,6	321	27,7	365	86,3	1137	13,2
ÅPÅ	1	98-2	S1-S4		0,3256	115,0530	2,89	334,5	250	22,9	347	95,7	1470	15,3
ÅPÅ	1	2	S5	980622	0,1777	62,7915	0,27	17,0	163	15,5	145	95,1	890	9,4
ÅPÅ	1	2	S6	980622	0,1567	55,3710	0,27	15,0	150	19,7	163	131,3	1087	8,3
ÅPÅ	1	3	S1	980831	0,3143	111,0601	2,81	312,1	198	15,9	407	80,3	2056	25,6
ÅPÅ	1	3	S2	980831	0,4803	169,7173	2,41	409,0	155	15,0	396	96,8	2555	26,4
ÅPÅ	1	3	S3	980831	0,3924	138,6572	2,59	359,1	149	15,4	398	103,4	2671	25,8
ÅPÅ	1	3	S4	980831	0,3730	131,8021	2,56	337,4	138	13,7	419	99,3	3036	30,6
ÅPÅ	1	98-3	S1-S4		0,3900	137,8092	2,59	354,4	160	15,0	405	94,9	2579	27,1
ÅPÅ	1	4	S1	981117	0,5270	186,2191	3,93	731,8	295	17,3	413	58,6	1400	23,9
ÅPÅ	1	4	S2	981117	0,6621	233,9576	3,97	928,8	311	19,5	428	62,7	1376	21,9
ÅPÅ	1	4	S3	981117	0,6308	222,8975	4,09	911,7	324	17,7	414	54,6	1278	23,4
ÅPÅ	1	4	S4	981117	0,7297	257,8445	3,76	969,5	208	17,8	408	85,6	1962	22,9
ÅPÅ	1	98-4	S1-S4		0,6374	225,2297	3,94	885,4	285	18,1	416	65,4	1504	23,03

*: for lite materiale i prøven til analyse

1999:

Lok	År	Periode	Prøve	Dato	DW g	DW g m ⁻²	Chla mg g ⁻¹	Chla mg m ⁻²	Tot-P µg/g TS	Tot-N µg/mg TS	TOC µg/mg TS	TN/TP	TOC/TP	TOC/TN
ÅPÅ	2	1	S1	990505	0,2968	104,8763	0,77	80,8	567	20,2	167	35,6	295	8,3
ÅPÅ	2	1	S2	990505										
ÅPÅ	2	1	S3	990505	0,1471	51,9788	1,73	89,9	535	35,1	356	65,6	665	10,1
ÅPÅ	2	1	S4	990505										
ÅPÅ	2	99-1	S1-S4		0,2220	39,2138	1,25	42,67	551	27,7	262	50,6	480	9,2
ÅPÅ	2	2	S1	990707	0,3094	109,3286	4,89	534,6	259	22,1	421	85,3	1625	19,0
ÅPÅ	2	2	S2	990707	0,2260	79,8587	4,84	386,5	219	23,9	414	109,1	1890	17,3
ÅPÅ	2	2	S3	990707	0,2124	75,0530	5,66	424,8	253	23,2	422	91,7	1668	18,2
ÅPÅ	2	2	S4	990707	0,2966	104,8057	5,95	623,6	223	22,0	416	98,7	1865	18,9
ÅPÅ	2	99-2	S1-S4		0,2611	92,2615	5,34	492,38	239	22,8	418	96,2	1762	18,4
ÅPÅ	2	3	S1	990907	0,4471	157,9859	4,23	668,3	284	18,2	411	64,1	1447	22,6
ÅPÅ	2	3	S2	990907	0,2832	100,0707	4,24	424,3	272	19,4	410	71,3	1507	21,1
ÅPÅ	2	3	S3	990907	0,1860	65,7244	3,91	257,0	377	19,1	412	50,7	1093	21,6
ÅPÅ	2	3	S4	990907	0,2914	102,9682	4,25	437,6	227	18,6	409	81,9	1802	22,0
ÅPÅ	2	99-3	S1-S4		0,3019	106,6873	4,16	446,79	290	18,8	411	67,0	1462	21,8
ÅPÅ	2	4	S1	991117	0,1313	46,3958	5,21	241,7	272	21,4	426	78,7	1566	19,9
ÅPÅ	2	4	S2	991117	0,2071	73,1802	5,02	367,4	272	19,4	429	71,3	1577	22,1
ÅPÅ	2	4	S3	991117	0,2508	88,6219	4,90	434,2	272	20,9	432	76,8	1588	20,7
ÅPÅ	2	4	S4	991117	0,1881	66,4664	4,07	270,5	259	19,9	430	76,8	1660	21,6
ÅPÅ	2	99-4	S1-S4		0,1943	68,6661	4,80	328,46	269	20,4	429	75,9	1598	21,07

2000:

Lok	År	Periode	Prøve	Dato	DW g	DW g m ⁻²	Chla mg g ⁻¹	Chla mg m ⁻²	µg/g TS	µg/mg TS	µg/mg TS	TN/TP	TOC/TP	TOC/TN
ÅPÅ	3	1	S1	000518	0,1425	50,3534	3,35	168,7	292	19,7	354	67,5	1212	18,0
ÅPÅ	3	1	S2	000518	0,2417	85,4064	3,88	331,4	380	21,5	392	56,6	1032	18,2
ÅPÅ	3	1	S3	000518	0,1985	70,1413	3,77	264,4	292	20,8	392	71,2	1342	18,8
ÅPÅ	3	1	S4	000518	0,2390	84,4523	4,28	361,5	349	21,9	394	62,8	1129	18,0
ÅPÅ	3	00-1	S1-S4		0,2054	72,5883	3,82	281,49	321	21,0	383	64,5	1179	18,3
ÅPÅ	3	2	S1	000626	0,2200	77,7385	6,97	541,8	286	20,2	393	70,6	1374	19,5
ÅPÅ	3	2	S2	000626	0,3326	117,5265	5,73	673,4	351	21,8	397	62,1	1131	18,2
ÅPÅ	3	2	S3	000626	0,2532	89,4700	4,93	441,1	316	22,2	358	70,3	1133	16,1
ÅPÅ	3	2	S4	000626	0,1734	61,2721	5,85	358,4	288	21,5	382	74,7	1326	17,8
ÅPÅ	3	00-2	S1-S4		0,2448	86,5018	5,87	503,70	310	21,4	383	69,4	1241	17,9
ÅPÅ	3	3	S1	000829	0,3221	113,8163	2,91	331,2	205	15,6	407	76,1	1985	26,1
ÅPÅ	3	3	S2	000829	0,3231	114,1696	3,08	351,6	169	15,9	418	94,1	2473	26,3
ÅPÅ	3	3	S3	000829	0,3873	136,8551	3,35	458,5	222	16	410	72,1	1847	25,6
ÅPÅ	3	3	S4	000829	0,3178	112,2968	2,61	293,1	144	13,8	407	95,8	2826	29,5
ÅPÅ	3	00-3	S1-S4		0,3376	119,2845	2,99	358,60	185	15,3	411	84,5	2283	26,9
ÅPÅ	3	4	S1											
ÅPÅ	3	4	S2											
ÅPÅ	3	4	S3											
ÅPÅ	3	4	S4											
ÅPÅ	3	00-4	S1-S4											

Vedlegg 5. Biomasseprøver av trådalger - Tovdalsvassdraget ved GAU (Gauslå) 1998-2000.

1998:

Lok	År	98-4	Periode	Dato	DW g	DW g m ⁻²	Chla mg/g	Chla mg/m ²	Tot-P µg/g TS	Tot-N µg/mg TS	TOC µg/mg TS	TN/TP	TOC/TP	TOC/TN
GAU	1	1	S1	980422										
GAU	1	1	S2	980422										
GAU	1	1	S3	980422										
GAU	1	1	S4	980422										
GAU	1	98-1	S1-S4											
GAU	1	2	S1	980622	0,0470	16,6078	1,17	19,4	243	20,4	363	84,0	1494	17,8
GAU	1	2	S2	980622	0,0087	3,0742	0,92	2,8	*	15,1	322			21,3
GAU	1	2	S3	980622	0,0415	14,6643	1,12	16,4	266	19,6	359	73,7	1350	18,3
GAU	1	2	S4	980622	0,0477	16,8551	1,02	17,2	180	17,3	311	96,1	1728	18,0
GAU	1	98-2	S1-S4		0,0362	12,8004	1,058	14,0	230	18,1	339	84,6	1524	18,9
GAU	1	3	S1	980902	0,3498	123,6042	1,85	228,7	177	15,4	395	87,0	2232	25,6
GAU	1	3	S2	980902	0,4365	154,2403	1,85	285,3	182	15,7	373	86,3	2049	23,8
GAU	1	3	S3	980902	0,2958	104,5230	1,52	158,9	136	14,4	388	105,9	2853	26,9
GAU	1	3	S4	980902	0,3166	111,8728	1,65	184,6	167	14,8	397	88,6	2377	26,8
GAU	1	98-3	S1-S4		0,3497	123,5601	1,718	214,4	166	15,08	388	92	2378	26
GAU	1	4	S1	981117	0,6275	221,7314	2,57	569,8	462	12,9	265	27,9	574	20,5
GAU	1	4	S2	981117	0,4081	144,2049	2,31	333,1	329	18,6	364	56,5	1106	19,6
GAU	1	4	S3	981117	0,5493	194,0989	3,34	648,3	337	14,5	320	43,0	950	22,1
GAU	1	4	S4	981117	0,6068	214,4170	3,07	658,3	301	16	324	53,2	1076	20,3
GAU	1	98-4	S1-S4		0,5479	193,6131	2,823	552,4	357	15,5	318	45	926	21

*: for lite materiale i prøven til analyse

1999:

Lok	År	99	Periode	Dato	DW g	DW g m ⁻²	Chla mg g ⁻¹	Chla mg m ⁻²	Tot-P µg/g TS	Tot-N µg/mg TS	TOC µg/mg TS	TN/TP	TOC/TP	TOC/TN
GAU	2	1	S1	990505	0,2383	84,2049	1,61	135,6	310	15,2	374	49,0	1206	24,6
GAU	2	1	S2	990505	0,1087	38,4099	1,73	66,4	310	16,4	395	52,9	1274	24,1
GAU	2	1	S3	990505	0,1392	49,1873	1,56	76,7	250	15,6	384	62,4	1536	24,6
GAU	2	1	S4	990505	0,1741	61,5194	1,52	93,5	289	15,3	392	52,9	1356	25,6
GAU	2	99-1	S1-S4		0,1651	58,3304	1,61	93,1	290	15,63	386	54	1343	25
GAU	2	2	S1	990707	0,4427	156,4311	3,73	583,5	274	17,5	380	63,9	1387	21,7
GAU	2	2	S2	990707	0,4794	169,3993	3,48	589,5	219	17,4	384	79,5	1753	22,1
GAU	2	2	S3	990707	0,3722	131,5194	4,53	595,8	253	18,3	393	72,3	1553	21,5
GAU	2	2	S4	990707	0,2514	88,8339	2,95	262,1	223	17,7	403	79,4	1807	22,8
GAU	2	99-2	S1-S4		0,3864	136,5459	3,67	507,7	242	17,7	390	74	1625	22
GAU	2	3	S1	990907	0,1552	54,8410	3,84	210,6	327	18,5	367	56,6	1122	19,8
GAU	2	3	S2	990907	0,3946	139,4346	3,88	541,0	305	17,6	378	57,7	1239	21,5
GAU	2	3	S3	990907	0,6299	222,5795	2,33	518,6	272	10,8	242	39,7	890	22,4
GAU	2	3	S4	990907	0,4734	167,2792	3,26	545,3	432	15,2	328	35,2	759	21,6
GAU	2	99-3	S1-S4		0,4133	146,0336	3,33	453,9	334	15,5	329	47	1003	21
GAU	2	4	S1	991117	0,2113	74,6643	4,62	344,9	298	18,3	335	61,4	1124	18,3
GAU	2	4	S2	991117	0,2300	81,2721	5,07	412,0	318	21,7	416	68,2	1308	19,2
GAU	2	4	S3	991117	0,2001	70,7067	5,36	379,0	344	21,6	397	62,8	1154	18,4
GAU	2	4	S4	991117	0,1696	59,9293	5,39	323,0	392	21,4	380	54,6	969	17,8
GAU	2	99-4	S1-S4		0,2028	71,6431	5,11	364,8	338	20,8	382	62	1139	18

2000:

Lok	År	2000	Periode	Dato	DW g	DW g m ⁻²	Chla mg g ⁻¹	Chla mg m ⁻²	Tot-P µg/g TS	Tot-N µg/mg TS	TOC µg/mg TS	TN/TP	TOC/TP	TOC/TN
GAU	3	1	S1	000518	0,0843	29,7880	2,23	66,4	479	18,2	358	38,0	747	19,7
GAU	3	1	S2	000518	0,1468	51,8728	2,02	104,8	419	16,0	346	38,2	826	21,6
GAU	3	1	S3	000518	0,1456	51,4488	1,78	91,6	515	18,1	371	35,1	720	20,5
GAU	3	1	S4	000518	0,0772	27,2792	1,86	50,7	396	17,1	370	43,2	934	21,6
GAU	3	00-1	S1-S4		0,1135	40,0972	1,97	78,4	452	17,35	361	39	807	21
GAU	3	2	S1	000626	0,2543	89,8587	3,06	275,0	324	17,0	363	52,5	1120	21,4
GAU	3	2	S2	000626	0,2384	84,2403	3,69	310,8	350	17,3	375	49,4	1071	21,7
GAU	3	2	S3	000626	0,2010	71,0247	2,86	203,1	388	17,0	346	43,8	892	20,4
GAU	3	2	S4	000626	0,1507	53,2509	2,86	152,3	401	20,0	364	49,9	908	18,2
GAU	3	00-2	S1-S4		0,2111	74,5936	3,12	235,3	366	17,8	362	49	998	20
GAU	3	3	S1	000829	0,4402	155,5477	2,46	382,6	207	16,5	391	79,7	1889	23,7
GAU	3	3	S2	000829	0,3026	106,9258	2,67	285,5	224	17,9	399	79,9	1781	22,3
GAU	3	3	S3	000829	0,4008	141,6254	2,83	400,8	212	16,5	400	77,8	1887	24,2
GAU	3	3	S4	000829	0,3638	128,5512	2,23	286,7	868	16,2	384	18,7	442	23,7
GAU	3	00-3	S1-S4		0,3769	133,1625	2,55	338,9	378	16,8	394	64	1500	23
GAU	3	4	S1	001123										
GAU	3	4	S2	001123										
GAU	3	4	S3	001123										
GAU	3	4	S4	001123										
GAU	3	00-4	S1-S4											

Vedlegg 6. Biomasseprøver av trådalger - Bjerkreimsvassdraget v. MAU (utl. Maudalsvatn) 1998-2000.

1998:

Lok	År	Periode	Prøve	Dato	DW g	DW g m ⁻²	Chla mg g ⁻¹	Chla mg m ⁻²	Tot-P µg/g TS	Tot-N µg/mg TS	TOC µg/mg TS	TN/TP	TOC/TP	TOC/TN
MAU	1	1	S1	980423	0,0411	14,523	3,61	52,428	1576	42,3	343	26,8	217,6	8,1
MAU	1	1	S2	980423	0,0637	22,509	1,97	44,342	1240	26,6	225	21,5	181,5	8,5
MAU	1	1	S3	980423	0,0827	29,223	1,49	43,542	1200	35,6	271	29,7	225,8	7,6
MAU	1	1	S4	980423	0,0634	22,403	1,06	23,747	1080	21,9	186	20,3	172,2	8,5
MAU	98-1	S1-S4			0,063	22,164	2,033	41,0148	1274	31,6	256,25	24,559	199,287	8,16823
MAU	1	2	S1	980623	0,0146	5,159	2,03	10,473	*	23,4	213			9,1
MAU	1	2	S2	980623	0,218	77,032	1,61	124,021	762	20,8	203	27,3	266,4	9,8
MAU	1	2	S3	980623	0,352	124,382	1,31	162,940	862	25,8	238	29,9	276,1	9,2
MAU	1	2	S4	980623	0,0173	6,113	1,31	8,008	*	30,3	287			9,5
MAU	98-2	S1-S4			0,15	53,171	1,565	76,3605	812	25,075	235,25	28,6135	271,253	9,38973
MAU	1	3	S1	980827										
MAU	1	3	S2	980827										ingen synlig vekst
MAU	1	3	S3	980827										
MAU	1	3	S4	980827										
MAU	98-3	S1-S4												
MAU	1	4	S1	981117	0,0099	3,498	10,8	37,781	*	55,7	429			7,7
MAU	4	2	S2	981117	0,0112	3,958	8,4	33,244	*	46,2	369			8,0
MAU	1	4	S3	981117	0,024	8,481	8,03	68,099	1780	40,3	353	22,6	198,3	8,8
MAU	1	4	S4	981117	0,0147	5,194	9,37	48,671	*	48,4	386			8,0
MAU	98-4	S1-S4			0,015	5,283	9,15	46,9487	1780	47,65	384,25	22,6404	198,315	8,10587

*: for lite materiale i prøven til analyse

1999:

Lok	År	Periode	Prøve	Dato	DW g	DW g m ⁻²	Chla mg g ⁻¹	Chla mg m ⁻²	Tot-P µg/g TS	Tot-N µg/mg TS	TOC µg/mg TS	TN/TP	TOC/TP	TOC/TN
MAU	2	1	S1	990506	0,0455	16,078	2,87	46,143	1526	43,2	303	28,3	198,6	7,0
MAU	2	1	S2	990506	0,0963	34,028	3,99	135,773	1551	56,9	414	36,7	266,9	7,3
MAU	2	1	S3	990506	0,0937	33,110	4,51	149,324	1695	60,7	407	35,8	240,1	6,7
MAU	2	1	S4	990506										ingen prøve
MAU	99-1	S1-S4			0,079	27,739	3,79	110,413	1590,67	53,6	374,667	33,6022	235,2	6,99831
MAU	2	2	S1	990630	0,0008	0,283	2,3	0,650						
MAU	2	2	S2	990630	0,0015	0,530	3,76	1,993						lite materiale
MAU	2	2	S3	990630	0,0011	0,389	2,5	0,972						mer Tabe flo enn grønnalger i denne prøven
MAU	2	2	S4	990630	0,0008	0,283	2,53	0,715						
MAU	99-2	S1-S4			0,0011	0,371	2,77	1,08251						
MAU	2	3	S1	990910	0,0061	2,155	13,7	29,530	991	46,9	449	47,3	453,1	9,6
MAU	2	3	S2	990910	0,0054	1,908	12,2	23,279	964	45	427	46,7	442,9	9,5
MAU	2	3	S3	990910	0,0141	4,982	12,8	63,774	1072	50,3	454	46,9	423,5	9,0
MAU	2	3	S4	990910	0,0123	4,346	13,1	56,936	838	46,6	454	55,6	541,8	9,7
MAU	99-3	S1-S4			0,009	3,3481	12,95	43,3799	966,25	47,2	446	49,1342	465,324	9,4577
MAU	2	4	S1	991117	0,0526	18,587	16,7	310,396	1826	53,9	443	29,5	242,6	8,2
MAU	2	4	S2	991117	0,0655	23,145	12,9	298,569	1776	54,8	437	30,9	246,1	8,0
MAU	2	4	S3	991117	0,0311	10,989	14,2	156,049	1629	55,5	450	34,1	276,2	8,1
MAU	2	4	S4	991117	0,0298	10,530	12,2	128,466	1684	49,2	447	29,2	265,4	9,1
MAU	99-4	S1-S4			0,045	15,813	14,00	223,37	1728,75	53,35	444,25	30,915	257,587	8,34671

2000:

Lok	År	Periode	Prøve	Dato	DW g	DW g m ⁻²	Chla mg g ⁻¹	Chla mg m ⁻²	Tot-P µg/g TS	Tot-N µg/mg TS	TOC µg/mg TS	TN/TP	TOC/TP	TOC/TN
MAU	3	1	S1	200519										
MAU	3	1	S2	200519										ingen synlig vekst
MAU	3	1	S3	200519										
MAU	3	1	S4	200519										
MAU	3	2000-1	S1-S4											
MAU	3	2	S1	200627										
MAU	3	2	S2	200627										ikke mulig å ta kvant prøve, løser seg opp
MAU	3	2	S3	200627										mer Tabe flo enn grønnalger i denne prøven
MAU	3	2	S4	200627										
MAU	3	2000-2	S1-S4											
MAU	3	3	S1	200901										
MAU	3	3	S2	200901										ikke mulig å ta kvant prøve, løser seg opp
MAU	3	3	S3	200901										mer Tabe flo enn grønnalger i denne prøven
MAU	3	3	S4	200901										
MAU	3	2000-3	S1-S4											
MAU	3	4	S1	201101										
MAU	3	4	S2	201101										ingen prøve, flom
MAU	3	4	S3	201101										
MAU	3	4	S4	201101										
MAU	3	2000-4	S1-S4											

Vedlegg 7. Biomasseprøver av trådalger - Bjerkreimsvassdr. v. MAL (neds. doserer Malmei) 1998-2000.

1998:

Lok	År	Periode	Prøve	Dato	DW g	DW g m ⁻²	Chla mg g ⁻¹	Chla mg m ⁻²	Tot-P µg/g TS	Tot-N µg/mg TS	TOC µg/mg TS	TN/TP	TOC/TP	TOC/TN
MAL	1	1	S1	980423										
MAL	1	1	S2	980423										
														ingen synlig vekst
MAL	1	1	S3	980423										
MAL	1	1	S4	980423										
MAL	98-1	S1-S4												
MAL	1	2	S1	980623										
MAL	1	2	S2	980623										
														ingen synlig vekst
MAL	1	2	S3	980623										
MAL	1	2	S4	980623										
MAL	98-2	S1-S4												
MAL	1	3	S1	980827	0,04	14,131	4,31	60,903	789	38,6	399	48,9	505,7	10,3
MAL	1	3	S2	980827	0,012	4,240	3,14	13,314	*	35,9	419			11,7
MAL	1	3	S3	980827	0,029	10,247	5,49	56,258	*	35,8	403			11,3
MAL	1	3	S4	980827	0,019	6,714	3,95	26,519	*	32,6	375			11,5
MAL	98-3	S1-S4			0,025	8,833	4,223	39,2488	789	35,725	399	48,9227	505,703	11,192
MAL	1	4	S1	981711										
MAL	1	4	S2	981711										
														ingen synlig vekst
MAL	1	4	S3	981711										
MAL	1	4	S4	981711										
MAL	98-4	S1-S4												

1999:

Lok	År	Periode	Prøve	Dato	DW g	DW g m ⁻²	Chla mg g ⁻¹	Chla mg m ⁻²	Tot-P µg/g TS	Tot-N µg/mg TS	TOC µg/mg TS	TN/TP	TOC/TP	TOC/TN
MAL	2	1	S1	990506										
MAL	2	1	S2	990506										ingen synlig vekst
MAL	2	1	S3	990506										
MAL	2	1	S4	990506										
MAL	99-1	S1-S4												
MAL	2	2	S1	990630	0,014	4,947	4,04	19,986		40,7	358,0			8,8
MAL	2	2	S2	990630	0,0082	2,898	3,56	10,315		41,7	351,0			8,4
MAL	2	2	S3	990630	0,0029	1,025	2,1	2,152	*	*				
MAL	2	2	S4	990630	0,0085	3,004	3,97	11,924		40,1	351			8,8
MAL	99-2	S1-S4			0,008	2,9682	3,42	11,0943	#DIV/0!	40,8333	353,333			8,65548
MAL	2	3	S1	990910	0,0469	16,572	7,76	128,602		65,2	458			7,0
MAL	2	3	S2	990910	0,0357	12,615	7,01	88,430		67,4	455			6,8
MAL	2	3	S3	990910	0,0456	16,113	8,69	140,023		61,2	431			7,0
MAL	2	3	S4	990910	0,0533	18,834	7,09	133,533		61,6	433			7,0
MAL	99-3	S1-S4			0,045	16,034	7,64	122,647	#DIV/0!	63,85	444,25			6,96175
MAL	2	4	S1	991117										
MAL	2	4	S2	991117										
MAL	2	4	S3	991117										ingen synlig vekst
MAL	2	4	S4	991117										
MAL	99-4	S1-S4												

*: for lite materiale i prøven til analyse

2000:

Lok	År	Periode	Prøve	Dato	DW g	DW g m ⁻²	Chla mg g ⁻¹	Chla mg m ⁻²	Tot-P µg/g TS	Tot-N µg/mg TS	TOC µg/mg TS	TN/TP	TOC/TP	TOC/TN
MAL	3	1	S1	200519										
MAL	3	1	S2	200519										
														ingen synlig vekst
MAL	3	1	S3	200519										
MAL	3	1	S4	200519										
MAL	2000-1	S1-S4												
MAL	3	2	S1	200627	0,0123	4,346	3,29	14,299	m	46,4	356			7,7
MAL	3	2	S2	200627	0,0207	7,314	7,39	54,054	m	46,3	389			8,4
MAL	3	2	S3	200627	0,0182	6,431	5,57	35,821	m	41,0	368			9,0
MAL	3	2	S4	200627	0,0184	6,502	5,48	35,630	1292	44,9	366	34,8	283,3	8,2
MAL	2000-2	S1-S4			0,017	6,1484	5,43	34,9511	1292	44,65	369,75	34,8	283,3	8,3
MAL	3	3	S1	200901	0,0457	16,148	3,6	58,134	629	37,8	342	60,1	543,7	9,0
MAL	3	3	S2	200901	0,0328	11,590	3,92	45,433	810	38,2	359	47,2	443,2	9,4
MAL	3	3	S3	200901	0,0344	12,155	4,28	52,025	629	35,2	326	56,0	518,3	9,3
MAL	3	3	S4	200901	0,0166	5,866	3,71	21,762	m	39,4	369			9,4
MAL	2000-3	S1-S4			0,032	11,44	3,88	44,3387	689,333	37,65	349	54,4	501,7	9,3
MAL	3	4	S1	201123										
MAL	3	4	S2	201123										
														ingen prøve, flom
MAL	3	4	S3	201123										
MAL	3	4	S4	201123										
MAL	2000-4	S1-S4												

m: for lite materiale til analyse

Vedlegg 8. Biomasseprøver-trådalger - Bjerkreimsvassdr. v. ØRS (utl. Ørsdalsvatn) 1998-2000.

1998:

Lok	År	Periode	Prøve	Dato	DW g	DW g m ⁻²	Chla mg g ⁻¹	Chla mg m ⁻²	Tot-P µg/g TS	Tot-N µg/mg TS	TOC µg/mg TS	TN/TP	TOC/TP	TOC/TN
ØRS	1	1	S1	980423	0,165	58,304	1,04	60,636	643	33,8	386	52,6	600,3	11,4
ØRS	1	1	S2	980423	0,0998	35,265	1,39	49,018	583	36,5	398	62,6	682,7	10,9
ØRS	1	1	S3	980423	0,1304	46,078	1,14	52,529	622	34,7	367	55,8	590,0	10,6
ØRS	1	1	S4	980423	0,1128	39,859	1,06	42,250	611	34,8	387	57,0	633,4	11,1
ØRS	1	98-1	S1-S4		0,127	44,876	1,158	51,1083	614,75	34,95	384,5	56,9792	626,602	11,0053
ØRS	1	2	S1	980623										
ØRS	1	2	S2	980623										
ØRS	1	2	S3	980623										
ØRS	1	2	S4	980623										
ØRS	1	98-2	S1-S4											
ØRS	1	3	S1	980827	0,1409	49,788	1,44	71,695	344	34,3	434	99,7	1261,6	12,7
ØRS	1	3	S2	980827	0,0884	31,237	0,76	23,740	355	36,3	412	102,3	1160,6	11,3
ØRS	1	3	S3	980827	0,1784	63,039	1,53	96,449	424	32,7	396	77,1	934,0	12,1
ØRS	1	3	S4	980827	0,0674	23,816	0,64	15,242	326	28,8	397	88,3	1217,8	13,8
ØRS	1	98-3	S1-S4		0,119	41,97	1,093	51,7816	362,25	33,025	409,75	91,8573	1143,49	12,4744
ØRS	1	4	S1	981117	0,1841	65,053	2,63	171,089	553	32,8	391	59,3	707,1	11,9
ØRS	1	4	S2	981117	0,1876	66,290	3,43	227,374	536	34,4	399	64,2	744,4	11,6
ØRS	1	4	S3	981117	0,1432	50,601	3,37	170,524	470	34,1	402	72,6	855,3	11,8
ØRS	1	4	S4	981117	0,042	14,841	2,51	37,251	464	31	364	66,8	784,5	11,7
ØRS	1	98-4	S1-S4		0,139	49,196	2,985	151,56	505,75	33,075	389	65,7139	772,814	11,7626

1999:

Lok	År	Periode	Prøve	Dato	DW g	DW g m ⁻²	Chla mg g ⁻¹	Chla mg m ⁻²	Tot-P µg/g TS	Tot-N µg/mg TS	TOC µg/mg TS	TN/TP	TOC/TP	TOC/TN
ØRS	2	1	S1	990506	0,0542	19,152	1,14	21,833	380	28,8	387	75,8	1018,4	13,4
ØRS	2	1	S2	990506	0,0806	28,481	1,47	41,866	338	30,5	388	90,2	1147,9	12,7
ØRS	2	1	S3	990506	0,0972	34,346	1,39	47,741	334	28,5	390	85,3	1167,7	13,7
ØRS	2	1	S4	990506	0,0703	24,841	1,29	32,045	301	25,4	391	84,4	1299,0	15,4
ØRS	2	99-1	S1-S4		0,076	26,705	1,32	35,8715	338,25	28,3	389	83,9352	1158,25	13,8092
ØRS	2	2	S1	990630	0,0659	23,286	2,05	47,737	614	33,7	406	54,9	661,2	12,0
ØRS	2	2	S2	990630	0,0309	10,919	2,01	21,947	985	26,7	362	27,1	367,5	13,6
ØRS	2	2	S3	990630	0,1049	37,067	1,94	71,910	369	24,5	393	66,4	1065,0	16,0
ØRS	2	2	S4	990630	0,0867	30,636	2,14	65,561	373	24,9	397	66,8	1064,3	15,9
ØRS	2	99-2	S1-S4		0,072	25,477	2,04	51,7887	585,25	27,45	389,5	53,7861	789,534	14,3975
ØRS	2	3	S1	990910	0,0286	10,106	5,79	58,514	557	28,4	416	51,0	746,9	14,6
ØRS	2	3	S2	990910	0,0129	4,558	5,44	24,797	*	30,9	403			
ØRS	2	3	S3	990910	0,0295	10,424	4,73	49,306	369	25,4	416	68,8	1127,4	16,4
ØRS	2	3	S4	990910	0,0254	8,975	5,08	45,594	463	25,2	411	54,4	887,7	16,3
ØRS	2	99-3	S1-S4		0,024	8,5159	5,26	44,5527	463	27,475	411,5	58,0833	920,639	15,0944
ØRS	2	4	S1	991117	0,1565	55,300	8,46	467,841	277	22	445	79,4	1606,5	20,2
ØRS	2	4	S2	991117	0,2163	76,431	7,21	551,068	325	21,7	423	66,8	1301,5	19,5
ØRS	2	4	S3	991117	0,0659	23,286	5,18	120,623	379	20,5	409	54,1	1079,2	20,0
ØRS	2	4	S4	991117	0,0502	17,739	5,76	102,174	406	25,6	414	63,1	1019,7	16,2
ØRS	2	99-4	S1-S4		0,122	43,189	6,65	310,426	346,75	22,45	422,75	65,8339	1251,72	18,9609

*: for lite materiale i prøven til analyse

2000:

Lok	År	Periode	Prøve	Dato	DW g	DW g m ⁻²	Chla mg g ⁻¹	Chla mg m ⁻²	Tot-P µg/g TS	Tot-N µg/mg TS	TOC µg/mg TS	TN/TP	TOC/TP	TOC/TN
ØRS	3	1	S1	200519	0,0978	34,558	2,28	78,793	437	39	437	89,2	1000,0	11,2
ØRS	3	1	S2	200519	0,0826	29,187	1,87	54,580	401	28,7	412	71,6	1027,4	14,4
ØRS	3	1	S3	200519	0,0973	34,382	2,19	75,296	512	38,3	413	74,8	806,6	10,8
ØRS	3	1	S4	200519	0,0529	18,693	2,15	40,189	436	31,9	406	73,2	931,2	12,7
ØRS	3	2000-1	S1-S4		0,083	29,205	2,12	62,2145	446,5	34,475	417	77,2	941,3	12,3
ØRS	3	2	S1	200627	0,0198	6,996	2,55	17,841		32,1	382	#DIV/0!	#DIV/0!	11,9
ØRS	3	2	S2	200627	0,0718	25,371	2,3	58,353	754	32,6	397	43,2	526,5	12,2
ØRS	3	2	S3	200627	0,0848	29,965	1,22	36,557	402	31,5	428	78,4	1064,7	13,6
ØRS	3	2	S4	200627	0,046	16,254	1,56	25,357	534	34,3	398	64,2	745,3	11,6
ØRS	3	2000-2	S1-S4		0,056	19,647	1,91	34,527	563,333	32,625	401,25	61,9	778,8	12,3
ØRS	3	3	S1	200901	0,156	55,124	2,76	152,141	390	21,9	407	56,2	1043,6	18,6
ØRS	3	3	S2	200901	0,2843	100,459	2,81	282,291	250	18,2	470	72,8	1880,0	25,8
ØRS	3	3	S3	200901	0,0785	27,739	2,99	82,938	266	19,5	412	73,3	1548,9	21,1
ØRS	3	3	S4	200901	0,4357	153,958	3,11	478,808	206	17,6	417	85,4	2024,3	23,7
ØRS	3	2000-3	S1-S4		0,239	84,32	2,92	249,045	278	19,3	426,5	71,9	1624,2	22,3
ØRS	3	4	S1	201101										
ØRS	3	4	S2	201101										
ØRS	3	4	S3	201101										
ØRS	3	4	S4	201101										
ØRS	3	2000-4	S1-S4											

Vedlegg 9. Biomasseprøver - trådalger - Suldalslågen v. OV (Suldalsosen) 1998-2000.
1998:

Lok	År	Peri- ode	Prøve	Dato	DW g	DW g m ⁻²	Chla mg g ⁻¹	Chla mg m ⁻²	Tot-P µg/g TS	Tot-N µg/mg TS	TOC µg/mg TS	TN/TP	TOC/TP	TOC/TN
OV2	1	1	S1	980416	0,3074	108,6219	1,04	112,97	489	16,2	271	33,1	554,2	16,7
OV2	1	1	S2	980416	0,3431	121,2367	1,37	166,09	628	15,7	243	25,0	386,9	15,5
OV2	1	1	S3	980416	0,3901	137,8445	1,18	162,66	521	18	339	34,5	650,7	18,8
OV2	1	1	S4	980416	0,326	115,1943	1,41	162,42	401	18,7	401	46,6	1000,0	21,4
OV2	98-1	S1-S4			0,3417	120,724	1,25	151,035	509,75	17,15	313,5	34,828	647,95	18,1208
OV2	1	2	S1	980626	0,0153	5,4064	1,06	5,73	*	21,7	303			14,0
OV2	1	2	S2	980626	0,0192	6,7845	1,2	8,14	*	18,5	323			17,5
OV2	1	2	S3	980626	0,0148	5,2297	1,35	7,06	312	18,5	370	59,3	1185,9	20,0
OV2	1	2	S4	980626	0,0616	21,7668	1,23	26,77	*	18,1	380			21,0
OV2	98-2	S1-S4			0,0277	9,797	1,21	11,9263	312	19,2	344	59,295	1185,9	18,1043
OV2	1	3	S1	980921	0,2713	95,8657	4,47	428,52	279	19,4	431	69,5	1544,8	22,2
OV2	1	3	S2	980921	0,1504	53,1449	3,68	195,57	291	19,7	408	67,7	1402,1	20,7
OV2	1	3	S3	980921	0,0758	26,7845	3,63	97,23	390	20,9	388	53,6	994,9	18,6
OV2	1	3	S4	980921	0,0982	34,6996	3,82	132,55	388	20,6	387	53,1	997,4	18,8
OV2	98-3	S1-S4			0,1489	52,624	3,9	213,468	337	20,15	403,5	60,979	1234,8	20,0695
OV2	1	4	S1	981118	0,0796	28,1272	2,97	83,54	318	20,1	382	63,2	1201,3	19,0
OV2	1	4	S2	981118	0,1154	40,7774	3,18	129,67	325	19,9	417	61,2	1283,1	21,0
OV2	1	4	S3	981118	0,1239	43,7809	3,5	153,23	376	21,5	389	57,2	1034,6	18,1
OV2	1	4	S4	981118	0,1831	64,6996	3,5	226,45	411	19,9	384	48,4	934,3	19,3
OV2	98-4	S1-S4			0,1255	44,346	3,2875	148,223	357,5	20,35	393	57,509	1113,3	19,3373

*: for lite materiale i prøven til analyse

1999:

Lok	År	Peri- ode	Prøve	Dato	DW g	DW g m ⁻²	Chla mg g ⁻¹	Chla mg m ⁻²	Tot-P µg/g TS	Tot-N µg/mg TS	TOC µg/mg TS	TN/TP	TOC/TP	TOC/TN
OV2	2	1	S1	990414	0,2021	71,4134	3,47	247,80	457	17,6	322	38,5	704,6	18,3
OV2	2	1	S2	990414	0,2407	85,0530	2,42	205,83	610	15,9	281	26,1	460,7	17,7
OV2	2	1	S3	990414	0,3219	113,7456	3,04	345,79	562	17,4	321	31,0	571,2	18,4
OV2	2	1	S4	990414	0,478	168,9046	2,95	498,27	604	17,1	323	28,3	534,8	18,9
OV2	99-1	S1-S4			0,3107	109,779	2,97	324,422	558,25	17	311,75	30,962	567,8	18,3264
OV2	2	2	S1	990628	0,0486	17,1731	2,19	37,61	378	17,3	384	45,8	1015,9	22,2
OV2	2	2	S2	990628	0,1232	43,5336	2,68	116,67	333	18,1	388	54,4	1165,2	21,4
OV2	2	2	S3	990628	0,147	51,9435	1,84	95,58	351	14,8	370	42,2	1054,1	25,0
OV2	2	2	S4	990628	0,1158	40,9187	3,5	143,22	395	18,6	387	47,1	979,7	20,8
OV2	99-2	S1-S4			0,1087	38,392	2,5525	98,2677	364,25	17,2	382,25	47,344	1053,7	22,3599
OV2	2	3	S1	990922	0,0228	8,0565	2,7	21,75	*	16,1	373			23,2
OV2	2	3	S2	990922	0,0283	10,0000	1,79	17,90	681	14,3	320	21,0	469,9	22,4
OV2	2	3	S3	990922	0,0097	3,4276	1,96	6,72	*	14,7	355			24,1
OV2	2	3	S4	990922	0,0426	15,0530	1,91	28,75	514	14,9	347	29,0	675,1	23,3
OV2	99-3	S1-S4			0,0259	9,134	2,09	18,7805	597,5	15	348,75	24,993	572,5	23,2459
OV2	2	4	S1	991111	0,0564	19,9293	3,16	62,98	472	21,4	326	45,3	690,7	15,2
OV2	2	4	S2	991111	0,0692	24,4523	3,41	83,38	571	20,3	328	35,6	574,4	16,2
OV2	2	4	S3	991111	0,1171	41,3781	3,64	150,62	438	20,8	317	47,5	723,7	15,2
OV2	2	4	S4	991111	0,1403	49,5760	3,26	161,62	511	21,2	308	41,5	602,7	14,5
OV2	99-4	S1-S4			0,0958	33,834	3,3675	114,648	498	20,925	319,75	42,467	647,9	15,29

*: for lite materiale i prøven til analyse

2000:

Lok	År	Peri- ode	Prøve	Dato	DW g	DW g m ⁻²	Chla mg g ⁻¹	Chla mg m ⁻²	Tot-P µg/g TS	Tot-N µg/mg TS	TOC µg/mg TS	TN/TP	TOC/TP	TOC/TN
OV2	3	1	S1	200413	0,129	45,5830	1,99	90,71						
OV2	3	1	S2	200413	0,0836	29,5406	1,59	46,97						
OV2	3	1	S3	200413	0,2371	83,7809	2	167,56						
OV2	3	1	S4	200413	0,2161	76,3604	2,32	177,16						
OV2	00-1	S1-S4			0,1665	58,81625	1,98	120,599						
OV2	3	2	S1	200629	0,1867	65,9717	1,9	125,35						
OV2	3	2	S2	200629	0,0098	3,4629	1,5	5,19						
OV2	3	2	S3	200629	0,0605	21,3781	2,3	49,17						
OV2	3	2	S4	200629	0,016	5,6537	1,11	6,28						
OV2	00-2	S1-S4			0,0683	24,11661	1,70	46,4965						
OV2	3	3	S1	200920	0,1216	42,9682	3,63	155,97						
OV2	3	3	S2	200920	0,1758	62,1201	2,69	167,10						
OV2	3	3	S3	200920	0,1961	69,2933	2,94	203,72						
OV2	3	3	S4	200920	0,1491	52,6855	2,81	148,05						
OV2	00-3	S1-S4			0,1607	56,76678	3,02	168,712						
OV2	3	4	S1	201123	0,1285	45,4064	3,42	155,29						
OV2	3	4	S2	201123	0,092	32,5088	3,35	108,90						
OV2	3	4	S3	201123	0,1023	36,1484	3,89	140,62						
OV2	3	4	S4	201123	0,1193	42,1555	3,9	164,41						
OV2	00-4	S1-S4			0,1105	39,05477	3,64	142,305						

Vedlegg 10. Biomasseprøver - trådalger - Suldalslågen v. OV10 (øvre Kvæstad) 1998-2000.

1998:

Lok	År	Peri- ode	Prøve	Dato	DW g	DW g m ⁻²	Chla mg g ⁻¹	Chla mg m ⁻²	Tot-P µg/g TS	Tot-N µg/mg TS	TOC µg/mg TS	TN/TP	TOC/TP	TOC/TN
OV10	1	1	S1	980416	0,2209	78,0565	2,24	174,85	910	26,8	344	29,5	378,0	12,8
OV10	1	1	S2	980416	0,2653	93,7456	2,14	200,62	934	26,1	340	27,9	364,0	13,0
OV10	1	1	S3	980416	0,2115	74,7350	1,61	120,32	848	26	349	30,7	411,6	13,4
OV10	1	1	S4	980416	0,2185	77,2085	1,79	138,20	801	27,3	363	34,1	453,2	13,3
OV10	98-1	S1-S4			0,2291	80,9364	1,95	158,497	873	26,55	349	31	402	13
OV10	1	2	S1	980626	0,3936	139,0813	1,34	186,37	562	10,9	176	19,4	313,2	16,1
OV10	1	2	S2	980626	0,0605	21,3781	1,17	25,01	813	20,4	288	25,1	354,2	14,1
OV10	1	2	S3	980626	0,2131	75,3004	1,35	101,66	647	17	287	26,3	443,6	16,9
OV10	1	2	S4	980626	0,1173	41,4488	1,32	54,71	658	17,5	275	26,6	417,9	15,7
OV10	98-2	S1-S4			0,1961	69,30212	1,30	91,9373	670	16,45	257	24	382	16
OV10	1	3	S1	980921	0,0638	22,5442	2,09	47,12	647	18,4	286	28,4	442,0	15,5
OV10	1	3	S2	980921	0,458	161,8375	1,87	302,64	588	19,7	323	33,5	549,3	16,4
OV10	1	3	S3	980921	0,0444	15,6890	2,02	31,69	655	20,9	256	31,9	390,8	12,2
OV10	1	3	S4	980921	0,0606	21,4134	2,28	48,82	627	20,6	321	32,9	512,0	15,6
OV10	98-3	S1-S4			0,1567	55,37102	2,07	107,567	629	19,9	297	32	474	15
OV10	1	4	S1	981118	0,1859	65,6890	3,38	222,03	657	17,2	263	26,2	400,3	15,3
OV10	1	4	S2	981118	0,1834	64,8057	3,43	222,28	587	20	325	34,1	553,7	16,3
OV10	1	4	S3	981118	0,2853	100,8127	3,25	327,64	683	18	282	26,4	412,9	15,7
OV10	1	4	S4	981118	0,2046	72,2968	3,36	242,92	717	22,5	348	31,4	485,4	15,5
OV10	98-4	S1-S4			0,2148	75,90106	3,36	253,718	661	19,4	305	29	463	16

1999:

Lok	År	Peri- ode	Prøve	Dato	DW g	DW g m ⁻²	Chla mg g ⁻¹	Chla mg m ⁻²	Tot-P µg/g TS	Tot-N µg/mg TS	TOC µg/mg TS	TN/TP	TOC/TP	TOC/TN
OV10	2	1	S1	990414	0,143	50,5300	2,49	125,82	761	25,1	365	33,0	479,6	14,5
OV10	2	1	S2	990414	0,1186	41,9081	2,65	111,06	937	28,5	391	30,4	417,3	13,7
OV10	2	1	S3	990414	0,1592	56,2544	2,85	160,33	843	25,1	346	29,8	410,4	13,8
OV10	2	1	S4	990414	0,1575	55,6537	2,7	150,27	865	27,9	380	32,3	439,3	13,6
OV10	99-1	S1-S4			0,1446	51,08657	2,67	136,867	852	26,7	371	31	437	14
OV10	2	2	S1	990628	0,0081	2,8622	2,2	6,30		13,8	231			16,7
OV10	2	2	S2	990628	0,0448	15,8304	1,97	31,19	591	14,9	246	25,2	416,2	16,5
OV10	2	2	S3	990628	0,1619	57,2085	1,42	81,24	526	9,1	140	17,3	266,2	15,4
OV10	2	2	S4	990628	0,1046	36,9611	2,42	89,45	661	16	254	24,2	384,3	15,9
OV10	99-2	S1-S4			0,0799	28,21555	2,00	52,0412	593	13,5	218	22	356	16
OV10	2	3	S1	990922	0,0785	27,7385	2,87	79,61	479	14	226	29,2	471,8	16,1
OV10	2	3	S2	990922	0,0421	14,8763	3,26	48,50	547	16,8	269	30,7	491,8	16,0
OV10	2	3	S3	990922	0,0535	18,9046	2,4	45,37	638	12	188	18,8	294,7	15,7
OV10	2	3	S4	990922	0,074	26,1484	2,6	67,99	585	11,1	185	19,0	316,2	16,7
OV10	99-3	S1-S4			0,062	21,91696	2,78	60,3658	562	13,5	217	24	394	16
OV10	2	4	S1	991111	0,1406	49,6820	6,12	304,05	756	23,2	318	30,7	420,6	13,7
OV10	2	4	S2	991111	0,1273	44,9823	6,19	278,44	697	24,1	327	34,6	469,2	13,6
OV10	2	4	S3	991111	0,2035	71,9081	6,07	436,48	583	22,2	331	38,1	567,8	14,9
OV10	2	4	S4	991111	0,1364	48,1979	6,1	294,01	718	23,6	325	32,9	452,6	13,8
OV10	99-4	S1-S4			0,152	53,69258	6,12	328,246	689	23,3	325	34	478	14

2000:

Lok	År	Peri- ode	Prøve	Dato	DW g	DW g m ⁻²	Chla mg g ⁻¹	Chla mg m ⁻²	Tot-P µg/g TS	Tot-N µg/mg TS	TOC µg/mg TS	TN/TP	TOC/TP	TOC/TN
OV10	3	1	S1	200413	0,1164	41,1307	3,93	161,64						
OV10	3	1	S2	200413	0,1805	63,7809	3,69	235,35						
OV10	3	1	S3	200413	0,1609	56,8551	2,97	168,86						
OV10	3	1	S4	200413	0,2382	84,1696	3,91	329,10						
OV10	00-1	S1-S4			0,174	61,4841	3,63	223,74						
OV10	3	2	S1	200629	0,0754	26,6431	2,02	53,82						
OV10	3	2	S2	200629	0,0695	24,5583	2,56	62,87						
OV10	3	2	S3	200629	0,3141	110,9894	1,67	185,35						
OV10	3	2	S4	200629	0,2422	85,5830	2,14	183,15						
OV10	00-2	S1-S4			0,1753	61,94346	2,10	121,297						
OV10	3	3	S1	200920	0,1793	63,3569	1,48	93,77						
OV10	3	3	S2	200920	0,1651	58,3392	2,13	124,26						
OV10	3	3	S3	200920	0,1712	60,4947	4,68	283,12						
OV10	3	3	S4	200920	0,2409	85,1237	1,73	147,26						
OV10	00-3	S1-S4			0,1891	66,82862	2,51	162,102						
OV10	3	4	S1	201123	0,132	46,6431	3,95	184,24						
OV10	3	4	S2	201123	0,1035	36,5724	8,16	298,43						
OV10	3	4	S3	201123	0,073	25,7951	5,72	147,55						
OV10	3	4	S4	201123	0,2265	80,0353	4,7	376,17						
OV10	00-4	S1-S4			0,1338	47,26148	5,63	251,596						

Vedlegg 11. Trådalger i Tovdalsvassdraget ved ÅPÅ (Åpål) 1998-2000. Tegnforklaring se vedlegg 18 og 19.

1998:

Lok	ÅPÅ	ÅPÅ	ÅPÅ	ÅPÅ	ÅPÅ	ÅPÅ	ÅPÅ	ÅPÅ	ÅPÅ	ÅPÅ	ÅPÅ	ÅPÅ	ÅPÅ	ÅPÅ	ÅPÅ	ÅPÅ	ÅPÅ	ÅPÅ	ÅPÅ	ÅPÅ	ÅPÅ	ÅPÅ		
År	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Periode	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
Prøve	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Farge-ufiksert (1-8)	6	6	6	6	3	3	5	5	5	5	8	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Vokste hvor (1-4)	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Vokste på (1-3)	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Mosetype (art)	Nar d	Nar d	Nar d	Nar d			Nard	Nard	Nard	Nard			Nard	Nard	Nard	Nard	Nard	Nard	Nard	Nard	Nard	Nard	Nard	
Trådlengde (1-6)					ikke målt						ikke målt					ikke målt				3	3	3	3	
Konsistens (1-2)	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Algefilt	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	
Notat-nr.	1	1	1	1			2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	
Grønnaalger																								
Binu tec	(8µm]	3	2	3	2			1	1	2	2													
Bulbochz																								
Chaetophorales																								
Kleb fla																								
Kleb mon																								
Kleb riv																								
Kleb sp1																								
Micr pal																								
Mi p;mi																								
Microspz	(21µm)																							
Moug a (6-10µm]																								
Moug a (13-17µm)																								
Mougeotz	(22-24µm)																							
Oedo a	(5-9µm)																							
Oedo b	(13-18µm)																							
Spriogyz	(24-25µm,IK,L)																							
Temnogaz	(13-15µm)																							
Zygo sp3	(18-24µm)	2	3	2	3			4	4	3	3					5	5	5	5	5	5	5	5	
Andre trådformede alger																								
Scyt mir	Cyan	x	x			1	1																	
Stig mam	Cyan																							
Tabe flo	lite chl a	x	x	x	x	4	4					5	5											
Antall taksa trådalger		3	3	3	3	1	1	2	2	2	2	0	0			ikke vurdert			ikke vurdert					

Vedlegg 11 fortsetter; Tegnforklaring se vedlegg 18 og 19.

1999:

Lok År Periode Prøve	ÅPA 2 1 S1	ÅPA 2 1 S2	ÅPA 2 1 S3	ÅPA 2 1 S4	ÅPA 2 2 S1	ÅPA 2 2 S2	ÅPA 2 2 S3	ÅPA 2 2 S4	ÅPA 2 3 S1	ÅPA 2 3 S2	ÅPA 2 3 S3	ÅPA 2 3 S4	ÅPA 2 4 S1	ÅPA 2 4 S2	ÅPA 2 4 S3	ÅPA 2 4 S4
Farge-ufiksert (1-8)	3	2	6	6	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
Vokste hvor (1-4)	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vokste på (1-3)	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mosetype (art)	Nard															
Trådlengde (1-6)	1	1	2	2	3	3	3	3	?	?	?	?	3	3	3	3
Konsistens (1-2)	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Algefilt	nei															
Notat-nr.	9	9	9	9	11	11	11	11	13	13	13	13	15	15	15	15
Trådformede grønnalger																
Binu tec (8µm)	1	1	2	1		x	x	x								
Bulbochz																
Chaetophorales																
Kleb fla																
Kleb mon																
Kleb riv																
Kleb sp1																
Micr pal					x	2	2	1	2	x						
Mi pa;mi	x															
Microspz (21µm)																
Moug a (6-10µm)																
Moug a (13-17µm)																
Mougeotz (22-24µm)																
Oedo a (5-9µm)																
Oedo b (13-18µm)																
Spriogyz (24-25µm,1K,L)																
Temnogaz (13-15µm)																
Zygo sp3 (18-24µm)	x		x	1	3	3	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5
Andre trådformede alger																
Scyt mir Cyan	1	1	2	x		x			x							
Stig mam Cyan	x															
Tabe flo lite chl a	3	3	1	3	2	3	3	3	2	1	1	1	x	x	x	x
Antall taksa trådalger	4	2	3	4									2	2	2	2

Vedlegg 11 fortsetter. Tegnforklaring, se vedlegg 18 og 19.

2000:

Lok År Periode Prøve	ÅPÅ 3 1 S1	ÅPÅ 3 1 S2	ÅPÅ 3 1 S3	ÅPÅ 3 1 S4	ÅPÅ 3 2 S1	ÅPÅ 3 2 S2	ÅPÅ 3 2 S3	ÅPÅ 3 2 S4	ÅPÅ 3 3 S1	ÅPÅ 3 3 S2	ÅPÅ 3 3 S3	ÅPÅ 3 3 S4	ÅPÅ 3 4 S1	ÅPÅ 3 4 S2	ÅPÅ 3 4 S3	ÅPÅ 3 4 S4
Farge ufiksert (1-8)	3	3	3	3	2(3)	2(3)	2(3)	2(3)	2(3)	2(3)	2(3)	2(3)				
Vokste hvor (1-4)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Vokste på (1-3)	2	2	2	2	2(3)	2(3)	2(3)	2(3)	2	2	2	2				
Mosetype (art)	Nard															
Trådlengde (1-6)	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	4	4	4	4	4	4				
Konsistens (1-2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Algefilt	nei															
Notat-nr.	17	17	17	17					20	20	20	20				
Trådformede grønmalger																
Binu tec (8µm]																
Bulbochz																
Chaetophorales																
Kleb fla																
Kleb mon																
Kleb riv																
Kleb sp1																
Micr pal																
Mi pa;mi																
Microspz (21µm)																
Moug a (6-10µm]																
Moug a (13-17µm)																
Mougeotz (22-24µm)																
Oedo a (5-9µm)																
Oedo b (13-18µm)																
Spriogyz (24-25µm,IK,L)																
Temnogaz (13-15µm)																
Zygo sp3 (15-18µm)	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5				
Andre trådformede alger																
Scyt mir Cyan																
Stig mam Cyan																
Tabe flo lite chl a	z	z	z	1	z	z	z	z	z	z	z	z				
Antall taksa trådalger	2	2	4	2	3	3	2	3	3	2	2	2				

Vedlegg 12. Trådalger i Tovdalsvassdraget ved GAU (Gauslå) 1998-2000. Tegnfoklaring, se vedlegg 18 og 19.

1998:

Lok	GAU	GAU	GAU	GAU	GAU	GAU	GAU	GAU	GAU	GAU	GAU	GAU	GAU	GAU
År	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Periode	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4
Prøve	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2
Farge-ufiksert (1-8)														
Farge-fiksert (1-8)					7	7	7	7	5	5	5	5	5	5
Vokste hvor (1-4)	ingen vekst				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vokste på (1-3)					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mosetype (art)					Nard	Nard	Nard	Nard	Nard	Nard	Nard	Nard	Nard	Nard
Trådlengde (1-6)														
Konsistens (1-2)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Algefilt					ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Notat-nr.	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
Grønne alger														
Binu tec (8µm)														
Bulbochz														
Chaetophorales														
Kleb fla														
Kleb mon														
Kleb riv														
Kleb sp1														
Micr pal														
Mi pa;mi														
Microspz (21µm)														
Moug a (6-10µm]														
Moug a (13-17µm)														
Mougeotz (22-24µm)														
Oedo a (5-9µm)														
Oedo b (13-18µm)														
Temnogaz (13-15µm)														
Zygo sp3 (18-24µm)					5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Andre trådformede alger														
Scyt mir Cyan														
Stig mam Cyan														
Tabe flo lite chl a														
Antall taksa trådalger														
	ikke vurdert				ikke vurdert				ikke vurdert					

Vedlegg 12 fortsetter. Tegnforklaring, se vedlegg 18 og 19.

1999:

Lok År Periode Prøve	GAU 2 1 S1	GAU 2 1 S2	GAU 2 1 S3	GAU 2 1 S4	GAU 2 2 S1	GAU 2 2 S2	GAU 2 2 S3	GAU 2 2 S4	GAU 2 3 S1	GAU 2 3 S2	GAU 2 3 S3	GAU 2 3 S4	GAU 2 4 S1	GAU 2 4 S2	GAU 2 4 S3	GAU 2 4 S4
Farge-ufiksert (1-8)									2	2	2	2	2	2	2	2
Vokste hvor (1-4)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vokste på (1-3)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mosetype (art)	Nard															
Trådlengde (1-6)	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Konsistens (1-2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Algefilt	ja	ja	ja	ja	?	?	?	?	ja							
Notat-nr.	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
Trådformede grønnalger																
Binu tec (8µm]																
Bulbochz																
Chaetophorales																
Kleb fla																
Kleb mon																
Kleb riv																
Kleb spl																
Micr pal	x															
Mi pa;mi	1															
Microspz (21µm)																x
Moug a (6-10µm]																
Moug a (13-17µm)																
Mougeotz (22-24µm)																
Oedo a (5-9µm)																
Oedo b (13-18µm)																
Temnogaz (13-15µm)																
Zygo sp3 (18-24µ)	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Andre trådformede alger																
Scyt mir Cyan																
Stig mam Cyan		x	x													
Tabe flo lite chl a									x	x	x	x	x	x	x	x
Antall taksa trådalger	3	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2	1	2	2	2

Vedlegg 12 fortsetter. Tegnforklaring, se vedlegg 18 og 19.

2000:

Lok År	GAU	GAU	GAU	GAU	GAU	GAU	GAU	GAU	GAU	GAU	GAU	GAU	GAU	GAU
Periode	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Prøve	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2
Farge-ufiksert (1-8)														
Farge-fiksert (1-8)														
Vokste hvor (1-4)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vokste på (1-3)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mosetype (art)	Nard	Nard	Nard,	Nard,	Nard									
Marsru	Marsru	Marsru												
Trædlengde (1-6)	2	2	2	2	4	4	4	4	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)		
Konsistens (1-2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Algefilt														
Notat-nr.	17	17	17	17	19	19	19	19	21	21	21	21		
Trådformede grønnalger														
Binu tec (8µm]					1									
Bulbochz														
Chaetophorales														
Kleb fla														
Kleb mon														
Kleb riv														
Kleb sp1														
Micr pal					z									
Mi pa;mi					z									
Microspz (21µm)														
Moug a (6-10µm]														
Moug a (13-17µm)														
Mougeotz (22-24µm)														
Oedo a (5-9µm)														
Oedo b (13-18µm)														
Temnogaz (13-15µm)														
Zygo sp3 (18-24µ)	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5		
Andre trådformede alger														
Scyt mir Cyan														
Stig mam Cyan														
Tabe flo Bacillar	z	z	z	z		z		z	z	z	z	z		
Antall taksa trådalger	1	1	3	2	1	2	1	2	2	4	4	3		

Vedlegg 13. Trådalger i Bjerkreimsvassdraget v. MAU (utl. Maudalsv.) 1998-2000. Tegnforklaring, se vedlegg 18 og 19.

1998:

Lok	MAU 1	MAU 1	MAU 1	MAU 1	MAU 1	MAU 2	MAU 2	MAU 2	MAU 1	MAU 3	MAU 3	MAU 3	MAU 1	MAU 4	MAU 4	MAU 4	MAU 1
År	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	
Periode																	
Prøve																	
Farge-ufiksert (1-8)	2	2	2	2	2	2	2	2					1	1	1	1	1
Farge-fiksert (1-8)	6	6	6	6	6	6	6	6					2	2	2	2	2
Vokste hvor (1-4)	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1
Vokste på (1-3)	2	2	2	2	2	2	2	2					2	2	2	2	2
Mosetype (art)	Nard	Nard	Nard	Nard	Nard	Nard	Nard	Nard					Nard	Nard	Nard	Nard	
Trådlengde (1-6)	3	3	3	3	1	1	1	1					2	2	2	2	
Konsistens (1-2)	2	2	2	2	2	2	2	2					1	1	1	1	
Algefilt	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei					nei	nei	nei	nei	
Notat-nr.	8	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	
Grønnalger																	
Bin tec	3	1	1	1			x	x									
Bulbochz		x	1	1													
Chaetophorales																	
Kleb fla																	
Kleb mon																	
Kleb riv	2	1	x	x	1	2	1	x					5	4	4	5	
Kleb sp1																	
Micr pal																	
Mi pa;mi																	
Microspz	(21 μ)	x	1	1	1	x	1	2	2	2	2	2					
Moug a (6-10 μ m)	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Moug a (13-17 μ m)																	
Mougeotz	(22-24 μ m)																
Oedo a (6-9 μ m)																	
Oedo b (13-18 μ m)																	
Spirogyz	24-25 μ m,1K,L																
Temogaz	(13-15 μ m)																
Zygo sp3																	
Andre trådf-alger																	
Scyt mir	Cyan												x	1	1	x	
Stig mam	Cyan																
Tabe flo	Bacillar	x	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2					
Antall taksa trådalger	5	6	6	6	6	6	4	5	5				2	2	2	2	

Vedlegg 13 fortsetter. Tegnforklaring , se vedlegg 18 og 19.

1999:

Lok År Periode Prøve	MAU 2 1 S1	MAU 2 1 S2	MAU 2 1 S3	MAU 2 1 S4	MAU 2 2 S1	MAU 2 2 S2	MAU 2 2 S3	MAU 2 2 S4	MAU 2 3 S1	MAU 2 3 S2	MAU 2 3 S3	MAU 2 3 S4	MAU 2 4 S1	MAU 2 4 S2	MAU 2 4 S3	MAU 2 4 S4
Farge-ufiksert (1-8)	1	1	1		3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	2
Farge-fiksert (1-8)									6				6	6	6	6
Vokste hvor (1-4)	2	2	2		1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Vokste på (1-3)	1	1	1	bare 3 prøver	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mosetype (art)	Scap, Nardia	Scap, Nardia	Scap, Nardia		Nard	Nard	Nard	Nard	Nard, Scap	Nard	Nard	Nard	Scap den,Nar d	Nard	Scap den,Nar d	Scap den,Nar d
Trådlengde (1-6)	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Konsistens (1-2)	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Algefilt	nei	nei	nei		nei											
Notat-nr.	21	21	21		22	22	22	22	23	23	23	23	24	24	24	24
Trådformede grønnalger					x	2	1	x					1		x	
Binu tec		2														
Bulbochz																
Chaetophorales																
Kleb fla																
Kleb mon																
Kleb riv		3	4	5					x	x		5		4	5	5
Kleb sp1																
Micr pal																
Mi pa;mi																
Microspz		(21μ)														
Moug a (6-10μm)						2	1	1	2					x	x	x
Moug a (13-17μm)						1	x	1	1							
Mougeotz		(22-24μm)														
Oedo a (6-9μm)																
Oedo b (13-18μm)																
Spirogyz		24-25μm,1K,L														
Temogaz		(13-15μm)														
Zygo sp3																
Andre trådformede alger																
Scyt mir	Cyan															
Stig mam	Cyan															
Tabe flo	Bacillar	x	1	x		2	2	2	2				x	x	x	x
Antall taksa trådalger		3	2	2		4	5	5	4				4	2	4	3

Vedlegg 13 fortsetter. Tegnforklaring, se vedlegg 18 og 19.

2000:

Lok År Periode Prøve	MAU 3 1 S1	MAU 3 1 S2	MAU 3 1 S3	MAU 3 1 S4	MAU 3 2 S1	MAU 3 2 S2	MAU 3 2 S3	MAU 3 2 S4	MAU 3 3 S1	MAU 3 3 S2	MAU 3 3 S3	MAU 3 3 S4	MAU 3 4 S1	MAU 3 4 S2	MAU 3 4 S3	MAU 3 4 S4	
Farge-ufiksert (1-8)					3												
Farge-fiksert (1-8)																	
Vokste hvor (1-4)					ingen synlig vekst				1								
Vokste på (1-3)									1(2)								
Mosetyp (art)									Nard								
Trådlengde (1-6)									1								
Konsistens (1-2)									2								
Algefilt																	
Notat-nr.									32								
Trådformede grønnalger																	
Binu tec									z	bare en kval prøve							
Bulbochz																	
Chaetophorales																	
Kleb fla																	
Kleb mon																	
Kleb riv													x				
Kleb sp1																	
Micr pal													x				
Mi pa;mi																	
Microspz	(21μ)																
Moug a (6-10μm)									1				x				
Moug a (13-17μm)									z								
Mougeotz	(22-24μm)																
Oedo a (6-9μm)																	
Oedo b (13-18μm)																	
Spirogyz	24-25μm,1K,L																
Temogaz	(13-15μm)																
Zygo sp3																	
Andre trådformede alger																	
Scyt mir	Cyan																
Stig mam	Cyan																
Tabe flo	Bacillar								4				5				
Antall taksa trådalger									4				4				

Vedlegg 14. Trådalger i Bjerkreimsvassdraget v. MAL (nedstrøms kalkdoserer v. Malmei) 1998-2000. Tegnforklaring, se vedlegg 18 og 19.

1998:

Lok	MAL	MAL	MAL	MAL	MAL	MAL	MAL	MAL	MAL	MAL	MAL	MAL	MAL	MAL	MAL	
År	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Periode	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	
Prøve	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Farge-ufiksert (1-8)									2	2	2	2				
Farge-fiksert (1-8)	7								2	2	2	2				
Vokste hvor (1-4)									1	1	1	1				
Vokste på (1-3)		ikke prøvetatt i april							2	2	2	2				ingen vekst
Mosetype (art)									Nard	Nard	Nard	Nard				
Trådlengde (1-6)									2	2	2	2				
Konsistens (1-2)									2	2	2	2				
Algefilt																
Notat-nr.	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	16
Gronnalger																
Binu tec																
Bulbochz																
Chaetophorales																
Kleb fla																
Kleb mon																
Kleb riv																
Kleb spl					x											
Micr pal																
Mi pa;mi																
Microspz	(21µm)															
Moug a (6-10µm)																
Moug a (15-17µm]																
Mougeotz	(22-24µm)															
Oedo a (6-9µm)																
Oedo b (13-18µm)																
Spirogzy	(24-25µm,1K,L)															
Temnogaz	(13-15µm)															
Zygo sp3													1	x	x	
Andre trådformede alger																
Scyt mir	Cyan															
Stig mam	Cyan															
Tabe flo	Bacillar								x		x					
Antall taksa									2	3	3	2				

Vedlegg 14 fortsetter. Tegnforklaring, se vedlegg 18 og 19.

1999:

Lok År Periode Prøve	MAL 2 1 S1	MAL 2 1 S2	MAL 2 1 S3	MAL 2 1 S4	MAL 2 2 S1	MAL 2 2 S2	MAL 2 2 S3	MAL 2 2 S4	MAL 2 3 S1	MAL 2 3 S2	MAL 2 3 S3	MAL 2 3 S4	MAL 2 4 S1	MAL 2 4 S2	MAL 2 4 S3	MAL 2 4 S4
Farge-ufiksert (1-8)					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Farge-fiksert (1-8)									6	6	6	6		6	6	
Vokste hvor (1-4)					1	1	1	1	1	1	1	1		1(2)		1(2)
Vokste på (1-3)					2	2	2	2	2	2	2	2		2		2
Mosetype (art)					Nard	Mars	Nard	Nard						Mars e		Mars ema
Trådlengde (1-6)					2	2	2	2	2	2	2	2		2		2
Konsistens (1-2)					2	2	2	2	2	2	2	2		?		?
Algefilt														ja		ja
Notat-nr.	25	25	25	25	26	26	26	26	27	27	27	27	28	28		28
Trådformede grønnalger									x	x				1	1	
Kleb fla																
Kleb mon																
Kleb riv																
Microspz (21µm)					5	5	5	5	5	5	5	5		1	1	
Moug a (6-10µm)									x							
Moug a (15-17µm)														x		x
Mougeotz (22-24µm)														x		
Oedo a (6-9µm)																
Oedo b (13-18µm)																
Spirogzy (24-25µm, 1K,L)																
Temnogaz (13-15µm)																
Zygo sp3																
Andre trådformede alger														3	3	
Cole sag	Cyan						x	x								
Stig mam	Cyan								x	x	x	x				
Tabe flo	Bacillar															
Antall taksa trådalger					1	2	2	1	4	3	2	2		5	4	

Vedlegg 14 fortsetter. Tegnforklaring, se vedlegg 18 og 19.

2000:

Lok År Periode Prøve	MAL 3 1 S1	MAL 3 1 S2	MAL 3 1 S3	MAL 3 1 S4	MAL 3 2 S1	MAL 3 2 S2	MAL 3 2 S3	MAL 3 2 S4	MAL 3 3 S1	MAL 3 3 S2	MAL 3 3 S3	MAL 3 3 S4	MAL 3 4 S1	MAL 3 4 S2	MAL 3 4 S3	MAL 3 4 S4	
Farge-ufiksert (1-8)					2	2	2	2	1(2)	1(2)	1(2)	1(2)					
Farge-fiksert (1-8)					ingen synlig vekst	1	1	1	1	1	1	1	1				
Vokste hvor (1-4)						2	2	2	2	2	2	2	2				
Vokste på (1-3)						Nard											
Mosetypet (art)						2	2	2	2	2	2	2	2				
Trådlengde (1-6)						2	2	2	2	2	2	2	2				
Konsistens (1-2)						31	31	31	31	34	34	34	34				
Algefilt																	
Notat-nr.																	
Trådformede grønnalger																	
Binu tec																	
Bulbochz																	
Chaetophorales																	
Kleb fla(sp1)																	
Kleb mon																	
Kleb riv																	
Kleb sp1																	
Micr pal																	
Mi pa:mi																	
Microspz	(21µm)																
Moug a (6-10µm)																	
Moug a (15-17µm]																	
Mougeotz	(22-24µm)																
Oedo a (6-9µm)																	
Oedo b (13-18µm)																	
Spirogyz	(24-25µm,1K,L)																
Temnogaz	(13-15µm)																
Zygo sp3	22-24µ																
Andre trådformede alger																	
Cole sag	Cyan																
Scyt mir	Cyan																
Stig mam	Cyan																
Tabe flo	Bacillar																
Antall taksa trådalger						z	z	z	z	z	z	z	z				
						2	2	2	2	4	2	4	3				

Vedelegg 15. Trådalger i Bjerkreimsvassdraget ved ØRS (utl. Ørsdalsvatn) 1998-2000. Tegnforklaring
se vedelegg 18 og 19.

1998:

Lok	ØRS	ØRS	ØRS	ØRS	ØRS	ØRS	ØRS	ØRS	ØRS	ØRS	ØRS	ØRS	ØRS	ØRS	ØRS
År	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Periode	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4
Prøve	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S4
Farge-ufiksert (1-8)	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
Farge-fiksert (1-8)	6	6	6	6					6	6	6	6	6	6	6
Vokste hvor (1-4)	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
Vokste på (1-3)	2	2	2	2					2	2	2	2	2	2	2
Mosetype (art)	Scap	Scap	Mars	Mars					Mars	Mars,	Nard	Nard	Nard	Nard& blad	Nard, Mars
Trådlengde (1-6)	2	2	2	2					2	2	2	2	3	3	3
Konsistens (1-2)	2	2	2	2					2	2	2	2	2	2	2
Algefilt	ja	ja	ja	ja					ja	ja	ja	noe	noe	noe	ja
Notat-nr.	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	5	6	7	7
Grønnalger															
Binu tec												x		x	x
Bulbochz															
Chaetophorales															
Kleb fla															
Kleb mon															
Kleb riv	2	3										4			
Kleb sp1			3	3					2	2		2	3	4	4
Micr pal	16µm	1	1	1	1				1	1	x				5
Mi pa;mi		2	1	1	1				2	2	1	3	2	1	1
Microspz	(21µm)														
Moug a (6-10µm)															
Moug a (15-17µm)												x			
Mougeotz	(22-24µm)														
Oedo a (6-9µm)															
Oedo b (13-18µm)															
Spirogyz	24-25µm,1K,L														
Temnogaz	(13-15µm)														
Zygo sp3	(18-22µm)											x			
Andre trådalger															
Stig mam	Cyan														
Scyt mir	Cyan														
Tabe flo	Bacillar	x							x	x	x		x	x	x
Antall taksa	3	4	3	3					4	5	4	4	3	5	3

Vedelegg 15 fortsetter. Tegnforklring, se vedlegg 18 og 19.

1999:

Lok År Periode Prøve	ØRS 2 1 S1	ØRS 2 1 S2	ØRS 2 1 S3	ØRS 2 1 S4	ØRS 2 2 S1	ØRS 2 2 S2	ØRS 2 2 S3	ØRS 2 2 S4	ØRS 2 3 S1	ØRS 2 3 S2	ØRS 2 3 S3	ØRS 2 3 S4	ØRS 2 4 S1	ØRS 2 4 S2	ØRS 2 4 S3	ØRS 2 4 S4
Farge-ufiksert (1-8)	2	2	2	2	2(3)	2(3)	2(3)	2(3)	2	2	2	2	2	2	2	2
Farge-fiksert (1-8)									7	7	7	7	5	5	5	5
Vokste hvor (1-4)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vokste på (1-3)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mosetype (art)	Scap, Hygro Nard	Scap, Hygro Nard	Scap, Hygro Nard	Scap, Hygro Nard	Masr acu	Nard	Nard	Nard	Scap, Hygro Nard	Scap, Hygro Nard	Scap, Hygro Nard	Scap, Hygro Nard	Nard, Hygo	Nard, Hygr	Nard, Hygr	Nard, Hygr
Trådlengde (1-6)	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3	3	3
Konsistens (1-2)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1(2)	1(2)	1(2)	1(2)
Algefilt	ja	ja	ja	ja					ja	ja	ja	ja	?	?	?	?
Notat-nr.	17	17	17	17	18	18	18	18	19	19	19	19	20	20	20	20
Trådformede grønmalger																
Bin tec	1	2	3	4	2	1	3	4	x	2	1	1				x
Bulbochz																
Chaetophorales																
Kleb fla																
Kleb mon																
Kleb riv	2	3	2	1	2	4	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1
Kleb sp1																
Micr pal	16µm	1	x							x	x					x
Mi pa;mi	1	x	x		1	x	x	x	1	x			1	1	1	
Microspz	(21µm)															
Moug a (6-10µm)										x						
Moug a (15-17µm)																
Mougeotz	(22-24µm)															
Oedo a (6-9µm)									x							x
Oedo b (13-18µm)																
Spirogyz	24-25µm,1K,L															
Temnogaz	(13-15µm)															
Zygomonium sp3?	(18-22µm)												3	3	3	1
Andre trådformede alger																
Stig mam	Cyan				x	x	x	x	x	x	x	x	x			1
Scyt mir	Cyan															
Tabe flo	Bacillar															
Antall taksa trådalger	5	5	4	2	4	4	4	4	4	7	5	4	5	3	6	

Vedlegg 15 fortsetter. Tegnforklaring, se vedlegg 18 og 19.

2000:

Lok År Periode Prøve	ØRS 3 1 S1	ØRS 3 1 S2	ØRS 3 1 S3	ØRS 3 1 S4	ØRS 3 2 S1	ØRS 3 2 S2	ØRS 3 2 S3	ØRS 3 2 S4	ØRS 3 3 S1	ØRS 3 3 S2	ØRS 3 3 S3	ØRS 3 3 S4	ØRS 3 4 S1	ØRS 3 4 S2	ØRS 3 4 S3	ØRS 3 4 S4
Farge-ufiksert (1-8)	2(4)	2(4)	2(4)	2(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	1(2)	1(2)	1(2)	1(2)	1(2)	1(2)	1(2)	1(2)
Farge-fiksert (1-8)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vokste hvor (1-4)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Vokste på (1-3)	Racom ,Nard	Narad	Racom	Raco	Scap	Nard	Racom	Nard	Hygo	Nard	hygr	Nard				
Mosetype (art)																
Trådlengde (1-6)	3	3	3	3	3	3	3	3	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)				
Konsistens (1-2)	1(2)	1(2)	1(2)	1(2)	2	2	2	2	1	1	1	1				
Algefilt	ja															
Notat-nr.	29	29	29	29	30	30	30	30	33	33	33	33				
Trådformede grønnalger																
Binu tec									z	z			1	z	z	z
Bulbochz									z							
Chaetophorales																
Kleb fla																
Kleb mon	1	1	2	2												
Kleb riv																
Kleb sp1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	z	z	1				
Micr pal	16µm															
Mi pa;mi	1	1	z	z					1	z	z	z				
Microspz	(21µm)															
Moug a (6-10µm)									z	z	z	3				
Moug a (15-17µm)																
Mougeotz	(22-24µm)								1	z						
Oedo a (6-9µm)																
Oedo b (13-18µm)																
Spirogyz	24-25µm,1K,L															
Temnogaz	(13-15µm)															
Zygomonium sp2 (14-15µ)					z	z			1	1	1					
Zygomonium sp? (18-22µm)													4			
Andre trådformede alger																
Stig mam	Cyan															
Scyt mir	Cyan															
Tabe flo	Bacillar															
Antall taksa trådalger	4	5	5	6	5	7	6	4	4	5	5	5				

Vedlegg 16. Trådalger i Suldalslågen ved OV2 (Suldalsosen) 1998-2000. Tegnforklaring, se vedlegg 18 og 19.

1998:

Lok	OV2	OV2	OV2	OV2	OV2	OV2	OV2	OV2	OV2	OV2	OV2	OV2	OV2	OV2	OV2	OV2
År	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Periode	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
Prøve	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Farge-ufiksert (1-8)																
Farge-fiksert (1-8)	7	7	6	6	7	7	6	6	6	5	5	6	6	6	6	6
Vokste hvor (1-4)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vokste på (1-3)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mosetype (art)	ikke mose i prøven	Nard	Poly,N ard	Nard	Nard, Scap,P oly	Nard	Nard	Nard	Scap	Scap	Blind& Nard	Nard	Nard	Nard	Nard	Nard
Trådlengde (1-6)					2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
Konsistens (1-2)	1	1	2	2	1	1	1	1	?	?	?	?	1&2	1&2	1&2	1&2
Algefilt	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei
Notat-nr.	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
<i>Grønnalger</i>																
Binu tec	x	x					x	x			x	x	x	1	1	1
Bulbochz							x	x								
Chaetophorales																
Kleb fla																
Kleb mon																
Kleb riv	x	x					x	1					x	x	x	x
Kleb spl																
Micr pal		x	3	3			1	1	1	1	x	x				
Mi pa;mi																
Microspz (21µm)	x	x					x				x	x	x	1	x	x
Moug a (6-10µm)	x	x					x				x	x	x	1	1	1
Moug a (15-17µm)	x	1					x				x	x	x			
Mougeotz (22-24µm)							x									
Oedo a (5-9µm)																
Oedo b (13-18µm)	x															
Spirogyz (24-25µm)																
Temnogaz (13-15µ)		1														
Zygo sp4 (20-24µm)	4	3	2	2			3	3	4	4	5	5	5	4	3	3
<i>Andre trådformede alger</i>																
Scyt mir	Cyan						5	1								
Stig mam	Cyan	1					x									
Tabe flo	Bacillar	x	x	x	x		2	2	4	x	2	3	x	6	x	x
Antall taksa trådalger	8	7	3	3			2	2	5	5	2	3	5	6	5	6

Vedelegg 16 fortsetter. Tegnforklaring, se vedlegg 18 og 19.

1999:

Lok År Periode Prøve	OV2 2 1 S1	OV2 2 1 S2	OV2 2 1 S3	OV2 2 1 S4	OV2 2 2 S1	OV2 2 2 S2	OV2 2 2 S3	OV2 2 2 S4	OV2 2 3 S1	OV2 2 3 S2	OV2 2 3 S3	OV2 2 3 S4	OV2 2 4 S1	OV2 2 4 S2	OV2 2 4 S3	OV2 2 4 S4	
Farge-ufiksert (1-8)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	2	2	2	2	2	2	2	2	
Farge-fiksert (1-8)	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	6	6	6	6	
Vokste hvor (1-4)	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
Vokste på (1-3)	Scap, Mars	Mars acu	Mars acu	Mars acu	Mars, acu,	Mars acu,	Mars acu,	Mars acu,	Nard, Scap, Mars	Nard, Scap, Mars	Nard, Scap, Mars	Nard, Scap, Mars	Mars acu	Mars acu	Mars acu	Mars acu	
Mosetype (art)	Trådlengde (1-6)	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3	3	3
Konsistens (1-2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
Algefilt	ikke sett																
Notat-nr.	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	
Trådformede grønmalger																	
Binu tec	x	x								x	x		1	1	1	2	
Bulbochz	x	x		x					4	4	4	4	x	x	1	1	
Bulbo sp2													x				
Chaetophorales																	
Gymnozyga																	
Kleb fla																	
Kleb mon																	
Kleb riv	x	x												1	1	x	
Kleb spl																	
Micr pal	1	x	2	x	5	1	4	3	x	x	x	x	x	1	x	1	
Mi pa;mi					x	x							x	x	x	1	
Microspz (21µm)																	
Moug a (6-10µm)	x	x		x									1	x	x	x	
Moug a (15-17µm)													2	1	x	x	
Mougeotz (22-24µm)																	
Oedo a (5-9µm)																	
Oedo b (13-18µm)																	
Spirogyz (24-25µm)																	
Temnogaz (13-15µm)																	
Zygo sp4 (19-24µm)	4	5	3	5	x	4	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
Andre trådformede alger																	
Scyt mir	x	x			x	x	x		x	x	x	x	x	x	1	x	
Stig mam	Cyan																
Tabe flo	Cyan																
Bacillar	Bacillar																
Antall taksa trådalger	6	7	3	4	3	3	3	3	4	3	6	5	7	11	10	8	

Vedlegg 16 fortsetter. Tegnforklaring, se vedlegg 18 og 19.

2000:

Lok År Periode Prøve	OV2 3 1 S1	OV2 3 1 S2	OV2 3 1 S3	OV2 3 1 S4	OV2 3 2 S1	OV2 3 2 S2	OV2 3 2 S3	OV2 3 2 S4	OV2 3 3 S1	OV2 3 3 S2	OV2 3 3 S3	OV2 3 3 S4	OV2 3 4 S1	OV2 3 4 S2	OV2 4 4 S3	OV2 4 4 S4
Farge-ufiksert (1-8)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	4(3)	4(3)	4(3)	4(3)	2(6)	2(6)	2(6)	2(6)
Farge-fiksert (1-8)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vokste hvor (1-4)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Vokste på (1-3)																
Mosetype (art)									Scap, Nard, Scap, Mars, Scap, Nard							
Trådlengde (1-6)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	2	2	2	2	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	5(6)	5(6)	5(6)	5(6)
Konsistens (1-2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Algefilt																
Notat-nr.	17	17	17	17	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22
Trådformede grønnalger																
Binu tec	z	z			z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	1	z
Bulbochz		1				z		z	z	z	z	2	z	z	z	z
Bulbo sp2																
Chaetophorales																
Gymnozyga																
Kleb fla																
Kleb mon																
Kleb riv	z	z	z	z					z	z	z	1	0,5	z	z	z
Kleb sp1																
Micr pal	2	2	2	2					2	2	z	1	0,5	z	z	z
Mi pa;mi					z				z	z						
Microspz (21µm)																
Moug a (6-10µm)	1	z	z	z										z	z	z
Moug a (15-17µm]														1	2	2
Mougeotz (22-24µm)																
Oedo a (5-9µm)									z							
Oedo b (13-18µm)										3						
Spirogyz (24-25µm)																
Temnogaz (13-15µm)																
Zygo sp4 (19-24µm)	2	2	3	3	5	5	3	z	5	3	4	2	4	3	2	3
Andre trådformede alger																
Cole sag																
Scyt mir		Cyan														
Stig mam		Cyan														
Tabe flo		Bacillar														
Antall taksa trådalger	5	6	4	5	3	3	5	8	8	7	7	8	7	7	7	7

Vedlegg 17. Trådalger i Suldaldalslågen ved OV10 (øvre Kvæstad) 1998-2000. Tegnforklaring, se vedlegg 18 og 19.

1998:

Lok	OV10	OV10	OV10	OV10	OV10	OV10	OV10	OV10	OV10	OV10	OV10	OV10	OV10	OV10	OV10	OV10
År	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Periode	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
Prøve	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Farge-ufiksert (1-8)					ikke registrert				ikke registrert				2	2	2	2
Farge-fiksert (1-8)	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Vokste hvor (1-4)	2	2	2	2	2	2	2	2	?	?	?	?	1	1	1	1
Vokste på (1-3)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mosetype (art)	Nard	Nard	Nard	Nard	Nard	Nard	N.B.P	Nard	Nard	Blind	N.B M	N.blad	Nard	Nard	Nard	N, H
Trådlengde (1-6)					?	?	?	?	?	?	?	?	5	5	5	5
Konsistens (1-2)					?	?	?	?	?	?	?	?	2	2	2	2
Algefilt	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei	nei
Notat-nr.	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8
Grønnalger									x				x		x	
Binu tec									x				x		x	
Bulbochz									x				x		x	
Chaetophorales																
Kleb fla																
Kleb mon																
Kleb riv	1	1	1	1	x	x	x	1	x	x	x	1	x	x	x	x
Kleb sp1					x	2	1	x	1	1	1	1	2	1	2	2
Micr pal	2	3	2	2					x				x		x	
Mi pa;mi									x				x		x	
Microspoz (21µm)	1	x	1	1					x	x	x	x	x	x	x	x
Moug a (6-10µm)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Moug a (13-17µm]	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mougeotz (22-24µm)									x				x			
Oedo a (5-6µm)									x							
Oedo b (13-18µm)																
Spirogyz (24-25µm,1K,L)						x			x		x					
Temogamz (13-15µ)																
Zygo sp4 (19-24µ)	1	1	1	1	5	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3
Andre trådformede alger																
Scyt mir	Cyan															
Stig mam	Cyan															
Tabe flo	Bacillar	x	x	x	x				x	x	x	x				
Antall taksa trådalger		6	7	6	7	5	6	7	5	10	8	9	7	6	6	5

Vedlegg 17 fortsetter. Tegnforklaring, se vedlegg 18 og 19.

1999:

Lok År Periode Prøve	OV10 S1	OV10 S2	OV10 S3	OV10 S4	OV10 S1	OV10 S2	OV10 S3	OV10 S4	OV10 S1	OV10 S2	OV10 S3	OV10 S4	OV10 S1	OV10 S2	OV10 S3	OV10 S4
Farge-ufiksert (1-8)	2	2	2	2	3	3	3	3	6	6	6	6	2	2	2	2
Farge-fiksert (1-8)	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
Vokste hvor (1-4)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vokste på (1-3)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mosetype (art)	Scap	Scap	Scap	Scapa	Scap, Mars, Mars, Font ant& dal	Mars,	Blin,	Scap, Nard	Scap, Mars	Scap, Blin	Scap, Mars	Scap, Mars	Nard, Mars	Nard, Scap	Nard, Mars	Nard, Scap
Trådlengde (1-6)	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Konsistens (1-2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Algefilt																
Notat-nr.	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	16
Trådformede grønnalger																
Binu tec									x	x	x	x			x	x
Bulbochz									1	x	x	x			x	x
Chaetophorales																
Kleb fla																
Kleb mon																
Kleb riv																
Kleb sp1																
Micr amo	24-27µ				x	x	x	x								
Micr pal		2	2	2	3	3	2	1	3	x	2	x	x	1	1	1
Mi pa;mi																
Microspoz	(21µm)															
Moug a (6-10µm)	x	1	1	1	x	1	x	2	1	x	x	x	x	x	x	x
Moug a (13-17µm)																
Mougeotz	(22-24µm)									x	x	x	x	x	x	x
Oedo a (5-6µm)									x	x	x	x	x	x	x	x
Oedo b (13-18µm)										x	x	x	x	x	x	x
Oedo c (26µ)										x	x	x	x	x	x	x
Spirogyz	(24-25µm,1K,L)									x	x	x	x	x	x	x
Temogamz	(13-15µm)									x	x	x	x	x	x	x
Zygo sp4	(19-24µ)	1	1	2	1	1	2	2	1	5	3	4	5	3	3	4
Andre trådformede alger									x	x	x	x			x	x
Scyt mir									x	x	x	x			x	x
Stig mam	Cyan															
Tabe flo	Cyan															
Bacillar	Bacillar	x	x				x		x	x	x	x	x	x	x	x
Antall taksa trådalger	4	6	6	6	3	6	5	3	6	7	6	7	6	7	6	6

Vedlegg 17 fortsetter. Tegnforklaring, se vedlegg 18 og 19.

2000:

Lok År Periode Prøve	OV10 3 1 S1	OV10 3 1 S2	OV10 3 1 S3	OV10 3 1 S4	OV10 3 2 S1	OV10 3 2 S2	OV10 3 2 S3	OV10 3 2 S4	OV10 3 3 S1	OV10 3 3 S2	OV10 3 3 S3	OV10 3 3 S4	OV10 3 4 S1	OV10 3 4 S2	OV10 3 4 S3	OV10 3 4 S4
Farge-ufiksert (1-8)	2	2	2	2	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3	3	3	3	2	2	2	2
Farge-fiksert (1-8)	1	1	1	1	1	1	1	1	(1)2	(1)2	(1)2	(1)2	1(2)	1(2)	1(2)	1(2)
Vokste hvor (1-4)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Vokste på (1-3)	Nard	Nard	Nard,	Nard,	Scap,	Scap,	Nard	Scap,	Nard				Nard,	Scap,	Scap.,	Scap,
Mosetype (art)			Scap	Scap	Nard	Nard		Nard					Scap,	Mars,	Nard,	Font,
													Poly	Nard	Mars,	Blin,F
Trådlengde (1-6)	3	3	3	3	2	2	2	2	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	4	4	4	4
Konsistens (1-2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Algefilt									21	21	21	21	23	23	23	23
Notat-nr.																
<i>Trådformede grønnalger</i>																
Binu tec									z	z	z					
Bulbochz										z						
Chaetophorales																
Desmidium swartzii					z											
Kleb fla																
Kleb mon																
Kleb riv		z	z	z	z	z	z	z	3	z	z	z	z	z	z	z
Kleb spl																
Micr amo	24-27μ	z														
Micr pal	2	2	2	4	3	1	1	1	1	z	z	z	1	2	2	2
Mi pa,mi			z	z	z	z	z	z					z	z	z	z
Microspoz	(21μm)	1	1	z	1											
Moug a (6-10μm)			z	z	z				z	z	z	z	z	z	z	z
Moug a (13-17μm)			z						z	z	z	z	z	z	z	z
Mougeotz	(22-24μm)															
Oedo a (5-6μm)									z							
Oedo b (13-18μm)																
Oedo c (26μ)																
Spirogyz	(24-25μm,1K,L)															
Temogamz	(13-15μm)															
Zygo sp4	(19-24μ)	2	2	2	z	2	4	4	4	1	5	5	5	4	3	3
<i>Andre trådformede alger</i>																
Scyt mir	Cyan															
Stig mam	Cyan															
Tabe flo	Bacillar									x	x					
Antall taksa trådalger	5	5	7	6	6	6	6	5	7	8	6	5	8	5	8	4

Vedlegg 18. Karakterisering av grønnalgeveksten i felt

Hvor:

1. i permanent vanndekket strømløp (% dekning)
2. i periodisk tørrlagte strandnære områder (% dekning)
2. i bakevjer/loner (% dekning)
2. annet (% dekning)

På substrat:

1. stein (størrelse)
2. mose (art kondisjon)
2. annen vegetasjon (art)

Form/størrelse:

1. korte dusker
2. tråder 0-2 cm lang
3. tråder 2-10 cm
4. tråder 10-20 cm
5. tråder 20-50 cm
6. tråder < 50 cm

Farge:

1	skarp grønne	5.	svarte
2.	frisk grønne	6.	mørk grønne
3.	gulgrønne	7.	brunlige
4.	blasse/rødlilla	8.	gul-/gråhvite

Konsistens:

1. tørre
2. glatte

Ikke algedekket vegetasjon: Moser/Makrovegetasjon (art, % dekning)

Vassdrag: Foto:	Lokalitet: Vannføring:	Dato: Temp:	Prøvetakere:	
Karakterisering av grønnalgeveksten	Permanent vanndekket strømløp	Periodisk tørrlagte strandnære områder	Bakevjer/loner	Annet
Dekning %				
På substrat (1-3)				
Form/størrelse (1-5)				
Farge (1-5)				
Konsistens (1-2)				
Ikke algedekket vegetasjon (art - %)				
Prøver:				

Vedlegg 19. Alle trådformede alger, grønnalger og andre, observert i trådalgeprosjektet i 1998, 1999 og 2000.

Latinske navn	Rubin kode
Trådformede grønnalger	
<i>Binuclearia tectorum</i>	Binu tec
<i>Bulbochaetae spp.</i>	Bulbochz
<i>Desmidium swartzii</i>	Desm swa
<i>Chaetophorales</i>	Chae sur
<i>Gymnozyga sp.</i>	Gymnozyz
<i>Klebsormidium flaccidum</i>	Kleb fla
<i>Klebsormidium montanum</i>	Kleb mon
<i>Klebsormidium rivulare</i>	Kleb riv
<i>Klebsormidium sp1</i>	Kebs sp1
<i>Microspora amoena</i>	Micr amo
<i>Microspora palustris</i>	Micr pal
<i>Microspora palustris v. minor</i>	Mi pa;mi
<i>Microspora sp. (21μ)</i>	Microspoz
<i>Mougeotia a (6-10μ)</i>	Moug a
<i>Mougeotia a/b (13-17μ)</i>	Moug a/b
<i>Mougeotia sp. (22-24μ)</i>	Mougeotz
<i>Oedogonium a (5-9μ)</i>	Oedo a
<i>Oedogonium b (13-18μ)</i>	Oedo b
<i>Oedogonium c (26μ)</i>	Oedo c
<i>Spirogyra sp. (24-25μ, 1k, L)</i>	Spirogyz
<i>Temnogametum sp. (13-15μ)</i>	Temnogaz
<i>Zygomonium sp2 (14-15μ)</i>	Zygo sp2
<i>Zygomonium sp3 (16-19μ)</i>	Zygo sp3
<i>Zygomonium sp4 (20-24μ)</i>	Zygo sp4
<i>Zygomonium sp? (18-22μ)</i>	Zygogonz
Andre trådformede alger	
<i>Coleodesmium sagarmathae</i>	Coleo sag
<i>Scytonema mirabile</i>	Scyt mir
<i>Stigonema mamillosum</i>	Stig mam
<i>Tabellaria flocculosa</i>	Tabe flo