



Statlig program for
forurensningsovervåking

Rapport 451|91

Oppdragsgiver


Statens forurensningstilsyn

Utførende institusjon

NIVA

Undersøkelser av Randsfjorden og Dokka 1988-92

Årsrapport for 1990



NIVA – RAPPORT

Norsk institutt for vannforskning  NIVA

Hovedkontor	Sørlandsavdelingen	Østlandsavdelingen	Vestlandsavdelingen
Postboks 33, Blindern 0313 Oslo 3	Grooseveien 36 4890 Grimstad	Rute 866 2312 Ottestad	Breiviken 5 5035 Bergen - Sandviken
Telefon (02) 23 52 80 Telefax (02) 39 41 29	Telefon (041) 43 033 Telefax (041) 42 709	Telefon (065) 76 752	Telefon (05) 95 17 00 Telefax (05) 25 78 90

Prosjektnr.: 0-800240 0-88103

Undernummer:

Løpenummer:

2575

Begrenset distribusjon:

Rapportens tittel:

Undersøkelser av Randsfjorden og Dokka 1988–92. Årsrapport for 1990. (Overvåningsrapport nr. 451/91) TA 753/1991

Dato:

mai 1991

Rapportnr.

0-800240

0-88103

Forfatter (e):

Sigurd Rognerud Jarl Eivind Løvik Pål Brettum

Faggruppe:

limnologi

Geografisk område:

Oppland

Antall sider (inkl. bilag):

39

Oppdragsgiver: Statens forurensningstilsyn (SFT)
--

(Statlig program for forurensningsovervåking)

Oppland Energiverk og Randsfjordforbundet

Oppdragsg. ref. (evt. NTNF-nr.):

Ekstrakt:

Reguleringen av Dokkføymagasinet førte til at store skogs- og myrområder ble satt under vann. Erosjon, suspensjon og opplosning av dette jordsmonnet vil betinge en høyere transport av næringssalter, spesielt fosfor, til Randsfjorden i flere år framover. Sesongen 1990 har vært den første med normale driftsår i Dokkaverkene. Algemengden i Randsfjorden var i 1990 noe høyere enn de foregående årene, spesielt i Flubergfjorden. Forholdene i denne delen av Randsfjorden ligger nær grensen for en betenklig tilstand. For øvrig har Randsfjorden en akseptabel vannkvalitet vurdert ut fra algemengder og bakteriologiske forhold. Observasjonene i 1991 vil vise om utviklingen mot økte alge-mengder fortsetter. Partikkeltransporten i Dokka er redusert etter 1988 og var i 1990 nær det en kan forvente i en naturlig elv. Vannkvaliteten forøvrig hadde endret seg lite etter regulering. Dette skyldes i hovedsak at det var små forskjeller på vannkvaliteten i Dokka og Etna også før regulering. I dag står reguleringssvannet for omtrent dobbelt så stor belastning av næringssalter til Randsfjorden som Etna og restnedbørfeltet til Dokka tilsammen.
--


4 emneord, norske:

1. Forurensningsovervåkning
2. Randsfjorden/Dokka
3. Reguleringsundersøkelser
4. Biologi og vannkjemi


4 emneord, engelske:

1. Pollution Monitoring
2. Randsfjorden/Dokka
3. Water-power regulations
4. Biology and water chemistry

Prosjektleder:



For administrasjonen:



ISBN 82-577-1908-0

FORMÅL - KONKLUSJON - TILRÅDNINGER

Formål

Hovedmålet med undersøkelsen er å klarlegge eventuelle effekter av kraftutbyggingen i Dokkavassdraget på vannkvaliteten i berørte deler av Dokka og i Randsfjorden. Dernest å følge utviklingen i Randsfjordens hovedvannmasser siden overvåkningsundersøkelsen i 1978-81, og å registrere regionale forskjeller i vannkvaliteten i områder av innsjøen som har store brukerinteresser.

Konklusjon

Reguleringen av Dokkfløymagasinet førte til at store skogs- og myrområder ble satt under vann. På bakgrunn av erfaringer fra tidligere reguleringer vil erosjon, suspensjon og oppløsning av dette jordsmonnet betinge en høyere transport av næringssalter, spesielt fosfor, til Randsfjorden i flere år framover. Sesongen 1990 har vært den første med full drift i Dokkaverkene. Algemengden i Randsfjorden var i 1990 noe høyere enn de foregående årene, spesielt i Flubergfjorden. Forholdene i denne delen av Randsfjorden ligger nær grensen for en betenklig tilstand. Forøvrig har Randsfjorden en akseptabel vannkvalitet vurdert ut fra algemengder og bakteriologiske forhold.

Observasjonene i 1991 vil vise om utviklingen mot økte algemengder fortsetter. Partikkeltransporten i Dokka ved Kolbjørnshus er redusert etter 1988 og var i 1990 nær det en kan forvente i en naturlig elv. Vannkvaliteten forøvrig hadde endret seg lite etter regulering. Dette skyldes i hovedsak at det var små forskjeller på vannkvaliteten i Dokka og Etna også før regulering. I dag står vannmassene fra den regulerte delen av Dokkas nedbørfelt for omtrent dobbelt så stor belastning av næringssalter til Randsfjorden som Etna og restnedbørfeltet til Dokka tilsammen.

Tilrådninger

For å kunne skille reguleringseffekter fra naturlige variasjoner trengs flere sammenhengende år med observasjoner. Dette er den eneste måten å kunne kvantifisere betydningen av en slik regulering som i Dokka. Det gjøres ikke observasjoner av utviklingen i vannkvaliteten i Dokkfløymagasinet slik at størrelsen og varigheten av demningseffekten er ukjent. Dette burde vært gjort da det er sentralt for den utvikling vi vil få i algemengden spesielt i Flubergfjorden i årene framover. Er den økte algemengden som er registrert i 1990 starten på en utviklingstrend? Denne typen regulering har alltid et langtidsperspektiv knyttet til effekter. Vi vil derfor tilråde at det følges med i vannkvaliteten ved en enkel overvåkning i Flubergfjorden og på hovedstasjonen (st.1) også etter 1991 for å kunne dokumentere utviklingstrenden. Det er viktig å avklare dette før feltsesongen starter i 1992 da sammenhengende årsobservasjoner er meget viktig for kvaliteten av vurderingene. Eventuelle effekter av Dokkareguleringen forventes å bli mest markert i den nordre delen av fjorden ned til Hov. Dette området bør derfor prioriteres i den kommende perioden. Likeledes er det viktig å følge vannkvaliteten i Dokka og i utløpstunnelen fra kraftverket ved Land Sag slik at transporter av de viktigste næringssaltene kan følges over tid og settes i sammenheng med eventuelle effekter i innsjøen.

1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn for undersøkelsen

En del generell bakgrunnsinformasjon er gitt i den første årsrapporten (Rognerud et al. 1989). Hensikt og målsetning med undersøkelsen er:

- klarlegge hvilke effekter kraftutbyggingen i Dokkavassdraget har for vannkvaliteten i berørte deler av Dokka og Randsfjorden.
- følge utviklingen i Randsfjordens hovedvannmasser siden overvåkningsundersøkelsen i 1978-81
- registrere eventuelle regionale forskjeller i vannkvalitet i Randsfjordens vannmasser i områder med store bruksinteresser.

Av andre delmål som undersøkelsen tar sikte på å klarlegge kan nevnes:

- kvantifisering av næringssalt-transporten til Randsfjorden fra Dokka før og etter regulering. Dernest å registrere vannkvaliteten i utløpstunnelen fra Dokka kraftverk og beregne transporten av næringssalter når anlegget settes i normal drift.
- klarlegge eventuelle endringer i forurensningssituasjonen i den delen av Dokka som får konsesjonsbetinget minstevannføring.

Randsfjordens og Dokka/Etna's nedbørfelter med stasjonsangivelser er vist i Fig.1 der det også er gitt en del morfometriske og hydrologiske data om Randsfjorden.

Etna ble ikke undersøkt i 1989 og i Dokka var det bare stasjonen ved Kolbjørnshus som ble undersøkt. I 1990 er alle stasjoner undersøkt etter samme program som i 1988 (Fig.1).




Fig.1

Randsfjorden og Dokka/Etna's nedbørfelter med stasjonsplassering for undersøkelsene.

1.2. Måleprogram

Det ble som hovedregel tatt ukentlige prøver i Dokka ved Kolbjørnshus (noe sjeldnere vinterstid). Ved de andre stasjonene i Dokka og Etna ble det samlet prøver månedlig i perioden juni-oktober. I perioden som Dokkaverkene var i drift ble det samlet prøver ukentlig i utløpstunnelen ved Land Sag. Prøvene ble analysert m.h.p. tot.P, tot.N, NO_3^- , NH_4^+ , turbiditet, pH, alkalitet, farge og ledningsevne.

Randsfjorden ble undersøkt på 6-stasjoner (Fig. 1) m.h.p. planteplankton, klorofyll, fekale indikatorbakterier og vannkjemi i perioden juni-oktober. Den kjemiske vannkvaliteten undersøkes som blandprøver 0-10m m.h.p. ledningsevne, pH, alkalitet, turbiditet, farge, tot.P, tot.N, NO_3^- og silisium. Dyreplankton ble undersøkt i samme periode på stasjonene 1, 2 og 6 og fra dypene 1, 5, 10, 15 og 20m.

2. RESULTATER

2.1. Nedbørsforhold

Nedbørsmengden har stor betydning for konsentrasjoner og massetransport av næringssalter og andre kjemiske komponenter i elvene som drenerer nedbørfeltet. Dessuten kan vannkvaliteten i Randsfjordens øvre varmere vannlag (epilimnion) i vekstsesongen være preget av avvanningen fra nedbørfeltet spesielt i nedbørsrike somre (Rognrud et al. 1989). I Fig. 2 viser nedbørmengden ved Kise meteorologiske stasjon (ved Gjøvik) for perioden 1988-90. Vekstsesongen 1988 var betydelig nedbørrikere enn normalt, mens 1989 var en tørr vekstsesong. Situasjonen i 1990 var nær normalen. Etter observasjonene i 1991 vil vi derfor ha et bedre grunnlag for å vurdere betydningen av naturlige variasjoner i forhold til reguleringsinngrepene, for vannkvaliteten i Randsfjorden.




Fig.2 Nedbørsmengden på Kise meteorologiske stasjon gitt som månedsummer for perioden 1988-90. Normalen er også gitt samt nedbørsmengder over normalen i vekstsesongen (skravert).

2.2. Randsfjorden

2.2.1. Vannkjemi

Resultatene av de vannkjemiske undersøkelsene i 1990 er samstilt med resultatene fra foregående år i Fig.3, 4, 5 og 6.

Surhetsgraden (pH) lå nær nøytralpunktet over hele innsjøen som middelverdi, men varierte i området 6,6-7,5. De laveste verdiene i 1990 ble observert i Flubergfjorden. Dette henger sammen med at vannet fra Dokkfløyvatn og den øvrige nordlige del av feltet er mer kalkfattig enn nedbørfeltet rundt den sydlige del av innsjøen (Hadeland). Forøvrig ga den tørre vekstsesongen i 1990 generelt mindre pH-variasjoner enn tidligere år. Alkalitets-verdiene viste at vannmassene hadde en moderat evne til å motstå pH-endringer ved tilførsel av surt vann. Det var også en svak økning i alkaliteten sydover i innsjøen begge år vesentlig på grunn av kalkrikere områder i de sydligste deler av nedbørfeltet.

De nordligste deler av innsjøen hadde gjennomgående høyere verdier for farge og turbiditet alle årene (Fig.4). Dette skyldes avvanningen av myr og skogsområdene i de nordligste deler

av nedbørfeltet som ga et høyere humusinnhold. De høyere turbiditetsverdiene i 1988 i forhold til de siste årene skyldes i hovedsak anleggsvirksomheten i forbindelse med Dokkaverkene kombinert med stor nedbørsmengde i 1988. I 1989 var vekstperioden meget tørr og humusavrenningen liten. Dessuten var turbiditeten i Dokka i 1989 og 1990 betydelig lavere enn i 1988 (Fig.13). De regionale forskjeller var derfor små i 1990 slik de også var året før.

Fosfor er det næringssaltet som begrenser algeveksten i Randsfjorden. Konsentrasjonen i 1990 varierte i området 3,5-6 µgP/l med en tendens til høyere verdier i de nordligste delene (Fig.5). Dette har sammenheng med Dokka's tilførsler og spesielt tilførlene fra reguleringsvannet som er påvirket av demningseffekten i Dokkfløymagasinet. Den nedbørfattige vekstssesongen i 1989 ga gjennomgående noe lavere konsentrasjoner på alle stasjonene selv om variasjonen i sesongen var betydelig. Resultatene fra disse tre årene viser at fosforkonsentrasjonen i Randsfjorden var tydelig influert av tilførlene fra øvre del av nedbørfeltet. Det kan være tendens til avtagende fosforverdier på alle stasjoner fra 1988 til 1990. Dette skulle gitt seg utslag i reduserte algebiomasser, men denne utviklingen er heller den motsatte. Vi tror derfor at denne utviklingstrenden av fosfor har analysetekniske årsaker og ikke skyldes reelle reduksjoner i konsentrasjonene.

Silikat er et annet viktig næringssalt spesielt for kiselalgene. I mange forurensede innsjøer blir innslaget av kiselalger stort i sommerperioden og silikatkonsentrasjonen avtar betydelig i overflateskiktet. I Randsfjorden var silikatkonsentrasjonen relativt stabil alle årene og viste ingen markerte regionale forskjeller eller noe avtak i produksjonsesongen (Fig.5). Dette viser at innslaget av kiselalger i planktonet var lite, noe som også ble bekreftet ved algetellingene.

Konsentrasjonen av nitrogenforbindelser økte sydover i innsjøen (Fig.6), både for nitrat og total nitrogen. Dette har sammenheng med den økte landbruksaktiviteten og befolkningsmengden i områdene rundt den sydligste delen av innsjøen. Nitratavtaket i produksjonsperioden var beskjedent. Dette viser også at algeproduksjonen ikke var spesielt høy. Det kan også være antydninger til en gjennomgående økning i nitrogenkonsentrasjonen på alle stasjonene syd for Flubergsfjorden. Observasjonene i 1991 vil gi et klarere bilde av dette.




Fig.3 Middelverdier (•) og variasjonsbredde (↔) i pH og alkalisitet i Randsfjorden for sjiktet 0-10m (blandprøve) i perioden juni-oktober.




Fig.4

Middelverdier (●) og variasjonsbredde (↔) for farge og turbiditet i Randsfjorden for sjiktet 0-10m (blandprøve) i perioden juni-oktober.




Fig.5 Middelverdier (•) og variasjonsbredde (↔) for totalfosfor og reaktivt siliuum i Randsfjorden for sjiktet 0-10m (blandprøve) i perioden juni-oktober.




Fig.6 Middelverdier (●) og variasjonsbredde (↔) for nitrat og total nitrogen i Randsfjorden for sjiktet 0-10m (blandprøve) i perioden juni-oktober.

2.2.2. Planteplankton

Planteplanktonmengden er her målt med to ulike metoder.

Klorofyll-konsentrasjonen er den enkleste måten. Den baserer seg på at en viss andel av algene inneholder klorofyll. Selv om denne andelen varierer noe for de ulike algegruppene gir metoden et brukbart mål på den totale planteplanktonmengden på en enkel måte. Resultatene fra disse målingene er vist i Fig.7 og tidsutviklingen fra tidligere undersøkelser i Fig.9.

Den andre metoden er mer omfattende og er basert på identifikasjon i mikroskop og telling av antallet celler. Volumet av de ulike arter blir beregnet og følgelige også for hele planteplankton-samfunnet. Fordelene med denne metoden er at den gir mulighet for å beregne andelen av de ulike planktongruppene. Resultatene fra disse registreringene er vist i Fig.8 og artslistene for 1990 er gitt i vedlegget (Tab.4).

Middelverdier av mengden planteplankton ut fra klorofyllmålinger og volumberegninger på de ulike stasjonene viste små regionale forskjeller. På alle stasjoner var imidlertid klorofyllmålingene høyere i 1990 enn tidligere år. Observasjonene i 1991 vil gi indikasjoner på om dette skyldes meteorologiske år til år variasjoner eller om det har andre årsaker som kan knyttes til reguleringen av Dokka. Mengdene kan likevel betegnes som lave slik at vannkvaliteten kan klassifiseres som lite til moderat påvirket på samtlige stasjoner.

Algesamfunnet besto alle år hovedsakelig av algegrupper som *Chrysophyceae* (gullalger) og *Cryptophyceae* samt et visst innslag av kiselalger. De vanligste artene blant gullalgene var *Chrysochromulina parva*, *Uroglena americana* og ulike arter innen slekten *Dinobryon*. Blant cryptomonadene var *Rhodomonas lacustris* (+var.*nannoplanctica*), *Katablepharis ovalis* og *Cryptomonas spp.* de vanligste artene. I 1990 var det arter innen slekten *Cyclotella* og *Melosira distans v. alpigena* som var de vanligste kiselalgene. Tidligere var innslaget av *Tabellaria fenestrata* mer betydelig. Artsammensetningen i Randsfjorden syd for Hov viser et planteplankton-samfunn som er typisk for store næringsfattige innsjøer.

På st.6 (Flubergfjorden) var algemengden klart høyere enn årene før. Det var spesielt artene *Dinobryon divergens* og *Uroglena americana* som sto for denne økningen. Disse artenes oppsving indikerer en økt næringssaltilførsel til vannmassene. Ved algetellingene ble det også registrert et stort innhold av uorganiske partikler ved denne stasjonene. Det er derfor rimelig å anta at demningseffekten med erosjon av jordmasser i Dokkfloymagasinet gir både en økt belastning av næringssalter og uorganisk materiale til Flubergfjorden.




Fig.7 Middelverdier (●) og variasjonsbredde (↔) for klorofyll a i sjiktet 0-10m (blandprøve) i Randsfjorden i perioden juni-oktober.




Fig.8 Variasjon i totalvolum og sammensetning av plankteplankton i ulike deler av Randsfjorden i 1988 og 1989. Blandprøver 0-10m.

I Randsfjorden forøvrig var det litt høyere algevolum i 1990 enn i 1988 og 1989. Således samsvarer dette med klorofyllanalysene. Det er imidlertid små forskjeller og observasjonene i 1991 kan gi svar på om dette er en utviklingstrend forårsaket av Dokkfløy-regulering eller om år til år variasjoner kan være like viktig.

Utviklingen fra tidligere undersøkelser er vist i Fig.9. Det er områdene utenfor Hov, utenfor Røykenvika og på hovedstasjonen ved Grymyr som gir muligheter for en tidsanalyse. Konsentrasjonen av planteplankton målt som middelverdi over vekstsesongen synes ikke å ha endret seg signifikant de siste 10 årene.




Fig.9 Tidsutviklingen i middelkonsentrasjonen av klorofyll a i Randsfjorden (0-10m), i perioden 1.juni-31.okt.

2.2.3. Dyreplankton

Kvantitative prøver av zooplanktonet ble samlet inn med en Schindlerfelle (25 l). Middelbiomassen av de viktigste artene samt totalbiomassen for årene 1988-90 er vist i Fig.10.

Zooplanktonets mengde og artssammensetning ved stasjon 1 har variert lite i den perioden undersøkelsen har pågått. Hoppekrepsten Eudiaptomus gracilis dominerte med 35-45% av totalbiomassen, mens bidraget fra hver av de fem andre vanligste artene var 10-15% alle årene. Disse fem var Daphnia galeata, Bosmina longispina, Holopedium gibberum, Mesocyclops leuckarti og Heterocope appendiculata.

Det var de samme artene som dominerte zooplanktonet i perioden 1978-80 på denne stasjonen, men den gangen var det i tillegg et markert innslag av Limnocalanus macrurus (Faafeng et.al. 1981). Denne arten ble registrert med små individantall i 1988 og 1989, men ble ikke funnet på stasjon 1 i 1990. L.macrurus synes å foretrekke lave temperaturer og forekommer om sommeren vesentlig under sprangsjiktet. De største forekomstene er registrert lengre nord i Randsfjorden (stasjon 2 og 6) hvor den også ble funnet i 1990. Det kan forøvrig nevnes at registreringen over en lang periode i Mjøsa tyder på at denne arten kan ha sykliske svingninger med fra 2 til 5 år mellom bestandstoppene (Rognerud & Kjellberg 1990).

Selv om utviklingsforløpet av de enkelte artene kan variere noe fra år til år, er den samlede mengden dyr som utvikles i den sydlige delen av innsjøen (st.1) trolig først og fremst bestemt av mengden tilgjengelig næring i form av planteplankton. Den stabiliteten som er observert i zooplanktonet ved stasjon 1 er antagelig et uttrykk for at det har vært små årlige variasjoner i næringstilgangen i form av alger (Fig.8) eller liten variasjon i betydningen av planktonspisende fisk.

Totalbiomassen av dyreplankton var omrent dobbelt så stor ved stasjon 2 og 6 som ved stasjon 1. Det var små regionale forskjeller i mengden næring i form av planteplankton i Randsfjorden, og dyreplanktonmengden var i overkant av det en ville forvente ut fra f.eks. klorofyllverdiene (jfr. Rognerud & Kjellberg 1984). På grunnlag av undersøkelser i et stort antall innsjøer i Norge viste Faafeng et.al. (1990) at forholdet mellom mengden alger og dyreplankton kan variere betydelig i slike næringsfattige innsjøer. Det er grunn til å anta at den relativt høge dyreplanktonbiomassen i nordre del av Randsfjorden for en stor del skyldes en ekstra tilgang på næring i form av dødt organisk materiale og bakterier. Denne delen av fjorden er tydelig mer påvirket av tilførsler fra Dokka, Etna og Dokkfløymagasinet som gir høyere verdier for farge og turbiditet og alger enn lengre sørover i fjorden. Tilsvarende forhold er også registrert i andre store innsjøer slik som Norsjø og Heddalsvatn i Telemark (Rognerud et.al.1979).




Fig.10 Zooplanktonbiomassen (mg tørrvekt/m²) i sjiktet 0-20m for perioden 1.juni-31. oktober. De viktigste artene er vist. I 1989 ble kun stasjon 1 og 6 undersøkt.
* observasjoner mangler.

Påvirkningen fra Dokka og Dokkfløymagasinet kan imidlertid også virke negativt på dyreplanktonet ved at stor gjennomstrømning i forbindelse med stor vannføring kan "spyle ut" store mengder dyr. Høyt innhold av uorganiske partikler i ellevannet kan dessuten virke uheldig på filtrerende dyreplankton ved at dyrene får for lavt netto energiinntak samtidig som de kan bli for tunge på grunn av opptak av mineralpartikler (se f.eks. Borgstrøm et.al.1986). Disse effektene gjør seg naturligvis mer gjeldende nærmest Dokka-deltaet. De lave mengdene av flere arter ved stasjon 6 i 1988 kan derfor skyldes kombinasjonen av stor utsøyling (mye nedbør) og høyt innhold av mineralpartikler (Rognerud et al. 1989).

Forskjellige arter reagerer ulikt på forskjellige miljøfaktorer, og det kan synes som om vannloppen Daphnia cristata hadde fordel av stor gjennomstømning i 1988 i motsetning til de fleste andre artene (jfr. Halvorsen et.al.1990). Denne arten, som dominerte ved stasjon 2 i 1988, gikk kraftig tilbake fram til 1990, mens de fleste andre artene hadde en betydelig økning i samme periode.

En må forøvrig anta at dominansforholdene mellom artene av vannlopper er påvirket av graden av predasjon fra planktonspisende fisk, særlig sik, i området. I hvilken retning dette slår ut er ikke entydig. Siklarvene ernærer seg antagelig av små planktonkrepser som larvestadiene (nauplier og copepoditter) av calanoide hoppekrepser på våren og forsommeren og går mer over til å spise vannlopper etterhvert som bestandene av disse øker utover sommeren (Styrvold et.al. 1981). Større fisk foretrekker trolig store individer av vannlopper som Daphnia galeata, Bosmina longispina og Holopedium gibberum, mens en mindre Daphnia-art som D.cristata ikke skulle være så utsatt for predasjon. Lengdemålinger av D.galeata og H.gibberum gir imidlertid ingen indikasjon på at predasjonspresset på disse to artene har vært vesentlig større i nordre deler av fjorden enn ved stasjon 1 (Fig.11). Dette til tross for at tettheten av sik har vært svært høg de senere årene, særlig i Flubergfjorden i august-september (Brabrand et.al.1989). Det forholdet at D.cristata var dominerende Daphnia-art ved stasjon 6, mens D.galeata dominerte ved stasjon 1 har derfor trolig like gjerne andre årsaker enn fiskepredasjon (se ovenfor).




Fig.11 Middellengder (± 1 standardavvik) av voksne hunner av *Daphnia galeata* og *Holopedium gibberum* i Randsfjorden.

2.2.4 Fekale indikatorbakterier.

Forekomsten av fekale indikatorbakterier (=termostabile koliforme bakterier) på 1m's dyp på 6 stasjoner i vekstperioden er vist i Fig.12. Fekale indikatorbakterier er et følsomt mål når det gjelder påvisning av kloakk og utsig fra husdyrgjødsel.

I 1988 var det tidvis moderat til stor forurensning av fekale indikatorbakterier i den nordligste delen av innsjøen og utenfor Røykenvika. Dette var knyttet til episoder med stor arealavrenning og antagelig en god del lekkasjer fra kloakknett.

I 1989 og 1990 var forurensningsgraden liten gjennom hele vekstsesongen og på samtlige stasjoner. Dette skyldes de langt "tørrere" vekstsesongene disse årene (Fig.2) med en lavere arealavrenning og mindre problemer med lekkasjer fra utette kloakknett. Resultatene fra disse årene viser hvor følsom den bakterielle vannkvaliteten i Randsfjorden er ovenfor variasjoner i arealavrenningen. Den langstrakte formen gjør at også de sentrale partier lett påvirkes av tilførsler fra omgivelsene i regnrike perioder. Observasjonene neste år vil forhåpentlig gi oss et bedre bilde av arealavrenningens betydning for mengden fekale indikatorbakterier i Randsfjordens øvre vannmasser.




Fig.12 Mengden fekale indikatorer (termostabile koliforme) på 1m's dyp i Randsfjorden i perioden juni-oktober. ● = ingen observerte indikatorbakterier.

2.3. Elvestasjoner

2.3.1 Dokka ved Kolbjørnshus

Undersøkelsen i Dokka ved Kolbjørnshus er i hovedsak basert på ukentlige målinger. En oversikt over Dokkareguleringen er gitt i Fig.13. Resultatene for de viktigste målingene er vist i Fig.14, 15 og 16 for hele perioden.




Fig.13

Dokka/Etna's nedbørfelt. Dokkfloymagasinets nedbørfelt (I) samt overførings-tunneler, kraftstasjoner og prøvetakingsstasjoner er også vist.

I 1988 ble det registrert en betenklig vannkvalitet med hensyn til partikkelttransport ved 11 tidspunkter og dårlig vannkvalitet i forbindelse med de store vannføringene i mai og juli. I 1989 og 1990 var vannføringen mindre og vannkvaliteten stort sett god gjennom hele sesongen. Dette henger sammen med nedtrappingen av anleggsaktivitetene og reguleringen med overføring av vann samt få store nedbørsepisoder.




Fig. 14 Turbiditet (FTU) i Dokka ved Kolbjørnshus. Grensene for god, betenklig og dårlig vannkvalitet er også vist.

Undersøkelser av det partikulære materialet (Fig. 15) viser også at andelen uorganisk materiale sank fra 1988 til 1989 og 1990. Dette skyldes hovedsakelig nedtrappingen i anleggsdriften. I de to siste årene har kvantiteten og kvaliteten av det partikulære materialet i Dokka vært mer lik forholdene i en naturlig elv.




Fig.15 Konsentrasjonen av partikulært materiale (PM) og den uorganiske andelen (PUM) i Dokka ved Kolbjørnshus.

Tidsutviklingen i næringssaltkonsentrasjonene i Dokka (st. Kolbjørnshus) er vist i Fig.16. Det har ikke skjedd betydelige endringer i konsentrasjonen for tot.P eller tot.N i perioden i 1988-90. Konsentrasjonene av nitrat synes derimot å ha sunket noe. Fosforkonsentrasjonene er jevnt over lavest vinterstid da mulighetene for erosjon er minst. Fosforkonsentrasjonen i Dokka er mest influert av erosjonsmateriale som kommer i størst mengde i forbindelse med flommer i vår/sommer/høst perioden.

Totalnitrogen og nitratverdiene derimot var høyest vinterstid. Dette skyldes i hovedsak at det biologiske opptaket av nitrat er minimalt på denne tiden av året og grunnvannstilsiget får en mer dominerende betydning i avrenningsvannet. Da nitrat utgjør en betydelig del av tot.N er det også rimelig at vi får de samme variasjonene for denne parameteren.




Fig.16 Månedlige middelverdier for konsentrasjonen av næringssalter i Dokka (Kolbjørnshus) i perioden 1988-91.

De årlige transporter er gitt i Tab.1. Transporten av næringssalter til Randsfjorden fra det naturlige nedbørfeltet til Dokka/Etna var lavere i 1989 enn de andre årene vesentlig på grunn av fyllingen av Dokkfløymagasinet. I 1990 var den årlige næringssaltbelastningen av reguleringsvannet fra Dokkaverkene større enn fra restfeltet til Dokka og Etna tilsammen. Dette skyldes som tidligere nevnt vesentlig demningseffekten i Dokkfløymagasinet. Totaltransporten i 1990 var nær verdiene i 1988 for fosfor, men bare ca halvparten for nitrogenforbindelsene. Det er mulig at anleggsdriften kombinert med et regnrikt år i 1988 er hovedårsaken til disse forskjellene. Observasjonen i 1991 vil gi grunnlag for en bedre vurdering av reguleringens betydning for transporten i forhold til naturlige svingninger forårsaket av klimatiske faktorer.

Tab.1 Årlig transport av næringssalter fra Etna/Dokka (stasjon Kolbjørnshus) og fra reguleringen Dokkfløyemagasinet + Kjøljua (stasjon Land Sag) og summen av disse i perioden 1988-91.

		Tot.P tonn/år	Tot.N tonn/år	NO ₃ tonn/år
Etna/Dokka Kolbjørnshus	1988	17.9	627	258
	1989	6.7	253	135
	1990	4.6	168	74
	1991			
Land Sag Utløp Dokka- verkene	1990	9.7	211	91
	1991			
SUM	1988	17.9	627	258
	1989	6.7	253	135
	1990	14.3	379	165
	1991			

2.3.2 Dokka oppstrøms Kolbjørnshus og Etna.

Månedlige kjemiprøver er samlet inn i perioden juni-oktober på 3 stasjoner i Dokka (D1, D2, D3 i Fig.1) og en stasjon i Etna (E1 Fig.1) i 1988 og 1990. Resultatene er vist i Fig.17 som middelverdier og variasjonsbredder.

Det kan være nærliggende først å sammenligne vannkvaliteten i Dokka før samløpet med Etna (st.Kornsilo) før og etter regulering og i Etna.

Vannets surhetsgrad og bufferefne (alk.) er relativt lik for begge elvene både før og etter regulering. Dokka var noe mer humusfarget enn Etna og hadde høyere partikkellinnhold (turbiditet) i 1988 vesentlig p.g.a. anleggsdriften. I 1990 har partikkellinnholdet vært nær det samme.

Konsentrasjonen av fosfor var også temmelig lik, mens Etna har en litt lavere konsentrasjon av nitrat og total nitrogen. Konsentrasjonene i Dokka var betydelig høyere oppe ved Valhovd bru antagelig som følge av sprengningsarbeider ved tunnelbyggingen. Bruk av dynamitt kan gi store nitrogentilskudd i avrenningsvannet. Vannføringen ved Valhovd bru er imidlertid liten etter reguleringen og de høye nitrogenverdiene tynnes ut p.g.a. tilrenningen fra andre bielver nedover i Dokka. Dette gjør at forskjellene likevel blir små mellom Etna og Dokka like før de møtes.




Fig.17 A. Middelverdier (•) og variasjonsbredde (⊖) for kjemiske målinger på 3 stasjoner i Dokka og en i Etna. Månedlige målinger i perioden juni-oktober.
 B. Middelverdier (•) og variasjonsbredde (⊖) for næringssaltanalyser på 3 stasjoner i Dokka og en i Etna. Månedlige målinger i perioden juni-oktober.

2.3.3 Dokka ved Kolbjørnshus og utløpet ved Land Sag.

Situasjonen i den øvre delen av Randsfjorden og spesielt Flubergfjorden (st.6) vil i høy grad være preget av vannkvaliteten i utløpsvannet fra kraftstasjonen og i Etna/Dokka. Mengden vann tilført fra disse innløpene vil gi oss en indikasjon på den relative betydningen for vannkvaliteten i Flubergfjorden. Dette er vist i Fig.18.

Vannet fra Dokkfløymagasinet som slippes ut ved Land Sag utgjorde en liten del i forhold til vannet fra Dokka i månedene (juni-oktober), mens det dominerte resten av året. Dette er et resultat av reguleringsingrepet der magasinert vann blir brukt til el-produksjon på vinterstid når den naturlig vannføringen er lav.




Fig.18 Vannføringen i Dokka/Etna ved Kolbjørnshus (skravert felt) i % av total vannmengde, som er summen Dokka/Etna og utløp kraftstasjon ved Land Sag (1990).

Vi kan derfor fastslå at basiskonsentrasjonen av f.eks. næringssalter i Flubergfjorden i vesentlig grad vil være et resultat av påvirkningen av vannet fra Dokkfløymagasinet, mens konsentrasjonene i øvre vannlag sommerstid vil være mer preget av vannkvaliteten i Dokka.

I hvilken grad skiller vannkvaliteten fra Dokkfløymagasinet seg fra vannkvaliteten i Dokka. I Fig.19 har vi vist middelverdier og spennvidden for en del parametre i 1990 i disse tilløpene sammen med observasjonene fra st.6 i Flubergsfjorden (R6). Surhetsgrad og bufferevne var svært lik for alle tre målepunktene, mens st.R6 naturligvis hadde en lavere turbiditet enn de andre på grunn av sedimentasjonene ute i fjorden.

Det var også små forskjeller på middelverdiene for nitrogenforbindelsene, men variasjonsbredden var størst ved målepunktene i tilløpene. Fosforkonsentrasjonene var derimot gjennomgående høyere i kraftverksutløpet enn i Etna/Dokka og begge tilløpene var høyere enn målepunktet i Flubergfjorden vesentlig på grunn av sedimentasjonen i fjorden. De høyere fosforverdiene i vannet fra Dokkfløymagasinet skyldes antagelig i hovedsak demningseffekten der store neddemte myr- og skogsområder vil gi økte næringssaltkonsentrasjoner utover det normale i mange år etter regulering som følge av erosjon og nedbrytning av terrestrisk organisk materiale.




Fig. 19 Middelverdier og variasjonsbredde for målinger i Dokka ved Kolbjørnshus (D), utløp kraftstasjon ved Land Sag (L.S.) og stasjonen i Flubergfjorden (Randsfjorden) R6 i 1990.

Vi har registrert en gjennomgående høyere algemengde i Randsfjorden 1990 enn i tidligere år. Det er imidlertid for tidlig å avgjøre i hvor stor grad dette skyldes en gunstig vekstsesong klimatisk sett eller om den økte næringssaltbelastningen fra Dokkfløyreguleringen er hovedårsaken.

LITTERATUR

- Borgstrøm,R., Brabrand,Å. og Solheim,J.T., 1986. Tilslamming og redusert siktedyprate i Ringedalsmagasinet: Virkning på habitatbruk, næringsopptak og kondisjon hos pelagisk aure. Rapp. Lab. Ferskv. Økol. Innlandsfiske, Oslo, 90, 36s.
- Brabrand,Å., Brittain,J.E. og Saltveit,S.J. 1989. Konsesjonsbetingede undersøkelser i Dokkavassdraget: Bunndyr, tetthet av ørretunger og livssyklusstudier av strømsik, Oppland fylke. Rapp. Lab. Ferskv. Økol. Innlandsfiske, Oslo, 111, 91s.
- Faafeng,B., Brettum,P., Gulbrandsen,T., Løvik,J.E., Rørslett,B. og Sahlqvist, E.Ø. 1981. Randsfjorden. Vurdering av innsjøens status 1978-80 og betydningen av planlagte reguleringer i Etna og Dokka. Hovedrapport. NIVA-rapp., Løpenr. 1342, 138s.
- Faafeng,B., Brettum,P. og Hessen,D. 1990. Landsomfattende undersøkelse av trofertilstanden i 355 innsjøer i Norge. NIVA-rapp., Løpenr. 2355, 57s.
- Halvorsen,G., Slørefeld,S.E. og Walseng,B. 1990. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Dokkedeltaet, Randsfjorden. I: Kroken,A. og Faugli,P.E. (red.) 1990. Etterundersøkelser i Dokka. Vassdragsdirektoratet, Rapp.nr.43, 182s.
- Rognerud,S., Berge,D. & Johannessen,M. 1979. Telemarkvassdraget. NIVA-rapport 0-70112
- Rognerud,S. og Kjellberg,G. 1984. Relationship between phytoplankton and zooplankton biomass in large lakes. Verh.Int.Verein.Limnol.22.s.666-671.
- Rognerud,S., Brettum,P. & Romstad,R. 1989. Undersøkelser av Randsfjorden og Dokka 1988-92. Årsrapport 1988. Løpenr. 2256.
- Rognerud,S. & Romstad,R. 1990. Undersøkelser av Randsfjorden og Dokka 1988-92. Årsrapport for 1989. Løpenr. 2403.
- Rognerud,S. og Kjellberg,G. 1990 Long-term dynamics og the zooplankton community in Lake Mjøsa, the largest lake i Norway. Verh.Int.Verein.Limnol. 24 (1).s.580-586.
- Styrvold,J.O., Brabrand,Å. og Saltveit,S.J. 1981. Fiskeribiologiske undersøkelser i forbindelse med reguleringsplanene for vassdragene Etna og Dokka, Oppland. III. Studier på ørret og sik i Randsfjorden og elvene Etna og Dokka. Rapp.Lab.Ferskv.Økol.Innlandsfiske, Oslo, 46,110s.

V E D L E G G

- Tab.1 Dyreplanktonbiomasser i Randsfjorden st.1, 1990
- Tab.2 Dyreplanktonbiomasser i Randsfjorden st.2, 1990
- Tab.3 Dyreplanktonbiomasser i Randsfjorden st.6, 1990
- Tab.4 Plantoplanktonbiomasser i Randsfjorden 1990.

Tab.1 Zooplanktonbiomasser i Randsfjorden (mg dw/m², 0-20m) for st.1, 1990.

	14/6	26/6	10/7	23/7	6/8	21/8	5/9	1/10	Middel
									-31/10
<i>Limocalanus macrurus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Heteropeope appendiculata</i>	130.3	8.5	260.6	95.8	65.0	54.6	40.9	0.1	67
<i>Eudiaptomus gracilis</i>	145.7	4.3	428.5	166.3	166.3	125.7	225.5	177.4	173
Calanoida	276.0	12.8	689.1	262.1	231.3	180.3	266.3	177.5	240
<i>Mesocyclops leuckarti</i>	56.7	4.2	26.8	29.4	35.3	119.0	98.4	17.9	40
<i>Cyclops</i> spp.	16.5	4.7	6.8	18.3	28.0	6.9	5.1	21.7	14
Cyclopoida	73.2	8.9	33.6	47.7	63.3	125.9	103.5	39.7	54
<i>Leptodora kindtii</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Holopedium gibberum</i>	57.6	86.4	345.6	34.6	10.7	22.4	9.7	3.5	55
<i>Daphnia galeata</i>	37.6	0.7	118.0	22.1	50.9	66.6	52.0	31.3	43
<i>Daphnia cristata</i>	0.2	-	0.7	2.9	1.5	2.2	0.7	3.7	1
<i>Bosmina longispina</i>	127.5	63.5	33.0	62.2	359.2	79.5	30.0	14.4	80
<i>Bosmina longirostris</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Polyphemus pediculus</i>	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-
<i>Bythotrephes longimanus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cladocera	223.9	151.1	497.3	121.8	422.5	170.7	92.4	52.9	179
Crustacea	573.1	172.8	1220.0	431.6	717.1	476.9	462.2	270.0	473

37

Tab.2 Zooplanktonbiomasser i Randsfjorden (mg dW/m², 0-20m) for st.2, 1990.

	14/6	26/6	10/7	23/7	6/8	21/8	5/9	1/10	1/6	Middel	-31/10
<i>Limnocalanus macrurus</i>	-	-	7.1	-	1.0	-	-	-	-	1	
<i>Heterocoope appendiculata</i>	139.1	111.6	230.4	10.2	300.5	100.4	75.3	-	-	96	
<i>Eudiaptomus gracilis</i>	205.7	286.8	567.1	26.2	861.8	772.3	386.3	159.7	159.7	350	
<i>Calanoida</i>	344.8	398.4	804.6	36.4	1163.3	872.7	461.6	159.7	159.7	447	
<i>Mesocyclops leuckartii</i>	94.0	170.4	107.9	42.6	85.8	63.4	168.9	26.4	26.4	70	
<i>Cyclops</i> spp.	7.4	9.6	10.3	3.0	4.1	0.8	5.4	9.5	9.5	6	
<i>Cyclopoida</i>	101.4	180.0	118.2	45.6	89.9	64.2	174.3	35.9	35.9	76	
<i>Leptodora kindtii</i>	40.5	48.0	1.2	-	1.0	24.0	-	-	-	14	
<i>Holopedium gibberum</i>	75.6	681.6	288.6	3.0	457.0	39.5	28.2	45.6	45.6	159	
<i>Daphnia galeata</i>	75.1	224.2	365.6	11.5	334.4	112.3	137.4	51.0	51.0	131	
<i>Daphnia cristata</i>	1.3	7.6	35.2	4.6	24.3	33.2	19.6	60.7	60.7	23	
<i>Bosmina longispina</i>	69.3	342.0	164.3	31.6	449.7	35.3	103.0	38.7	38.7	127	
<i>Bosmina longirostris</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Polyphemus pediculus</i>	-	0.8	-	-	1.6	-	-	-	-	-	
<i>Bythotrephes longimanus</i>	-	-	5.6	-	5.6	-	-	-	-	1	
<i>Cladocera</i>	261.8	1304.2	860.5	50.7	1273.6	244.3	288.2	196.0	196.0	455	
<i>Crustacea</i>	708.0	1882.6	1783.3	132.7	2526.8	1181.2	924.1	391.6	391.6	978	

Tab.3 Zooplanktonbiomasser i Randsfjorden (mg dW/m², 0-20m) for st.6, 1990.

	14/6	26/6	10/7	23/7	6/8	21/8	5/9	1/10	1/6	Middel	-31/10
<i>Limnocalanus macrurus</i>	28.3	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	6
<i>Heteropeope appendiculata</i>	33.5	2.5	6.5	22.7	161.7	39.4	107.5	0.1	4.4		
<i>Eudiaptomus gracilis</i>	5.4	6.5	13.1	63.0	361.3	719.4	342.4	87.4	15.6		
<i>Calanoida</i>	67.2	9.0	19.6	85.7	523.0	758.8	449.9	107.2	20.6		
<i>Mesocyclops leuckartii</i>	1.8	2.6	22.9	55.6	168.0	55.9	117.3	11.3	4.6		
<i>Cyclops</i> spp.	18.6	6.9	10.7	7.2	3.9	3.0	0.4	4.5	7		
<i>Cyclopoida</i>	20.4	10.2	33.6	62.8	171.9	58.9	117.7	15.8	5.3		
<i>Leptodora kindtii</i>	—	1.0	48.0	96.0	1.0	—	—	—	—	—	1.8
<i>Holopedium gibberum</i>	17.6	37.0	67.2	26.9	215.0	40.3	68.6	40.3	57		
<i>Daphnia galeata</i>	7.3	8.3	3.1	6.2	37.4	30.2	48.7	7.3	20		
<i>Daphnia cristata</i>	29.3	89.3	224.3	623.4	740.7	307.6	220.7	258.7	27.1		
<i>Bosmina longispina</i>	131.7	32.8	50.0	39.5	47.0	70.0	268.7	149.9	105		
<i>Bosmina longirostris</i>	1.1	0.6	0.8	1.3	0.3	0.3	0.8	2.4	1		
<i>Polyphemus pediculus</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
<i>Bythotrephes longimanus</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
<i>Cladocera</i>	187.0	169.0	393.4	793.3	1041.4	448.4	607.5	458.6	472		
<i>Crustacea</i>	274.6	188.2	446.6	941.8	1736.3	1266.1	1175.1	581.6	731		

Tabell 4... Kvantitative plantoplanktonprøver fra Randsfjorden st. I (bl.pr.0-10 m dyp)
Volum mm³/m³

GRUPPER/ARTER	Dato=>	900614	900626	900710	900723	900806	900821	900905	901002
<i>Cyanophyceae (Blågrønalgger)</i>									
<i>Anabaena flos-aquae</i>	-	-	-	-	.5	.4	-	-	
Sum	-	-	-	-	.5	.4	-	-	
<i>Chlorophyceae (Grønalgger)</i>									
<i>Batrachococcus braunii</i>	-	-	-	-	.6	-	-	.6	
<i>Chlamydomonas sp. (I=8)</i>	-	-	.5	-	-	-	-	-	
<i>Cosmarium sp. (I=8,b=8)</i>	.7	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Cosmarium sphagnicolum v.pachyonum</i>	-	-	-	.4	-	-	-	-	
<i>Elakothrix gelatinosa (genevensis)</i>	-	-	.3	-	-	.3	-	-	
<i>Elakothrix viridis</i>	-	-	.4	-	-	-	-	-	
<i>Gyromitus cordiformis</i>	-	1.1	-	1.2	2.4	-	-	-	
<i>Monoraphidium dybowskii</i>	-	.2	.2	.5	.2	.5	.8	.9	
<i>Monoraphidium griffithii</i>	-	-	.2	.2	-	-	-	-	
<i>Nephrocytium agarhianum</i>	-	-	.2	.2	-	-	-	-	
<i>Oocystis lacustris</i>	.2	-	-	.2	.2	-	-	-	
<i>Oocystis submarina v.variabilis</i>	..	1.1	.2	1.5	2.2	1.7	2.2	.4	
<i>Quadriguia korschikovii</i>	-	-	-	-	-	-	.1	-	
<i>Scenedesmus denticulatus v.linearis</i>	-	-	.1	-	-	-	-	-	
<i>Scenedesmus sp.</i>	1.6	2.0	1.4	2.0	1.0	.5	-	.4	
<i>Scourfieldia cordiformis</i>	-	-	.1	.2	-	-	.2	.2	
<i>Sphaerocystis schroeteri</i>	-	-	.5	-	-	-	-	-	
<i>Tetraedron minimum v.tetralobatum</i>	3.3	2.8	5.7	1.5	2.8	.6	1.1	1.1	
Übest.cocc.gr.alge (Chlorella sp.?)	-	-	-	.5	-	-	-	-	
Übest.gr.flagellat	-	-	-	-	.2	.3	-	-	
Sum	6.1	7.1	9.7	8.3	9.6	3.9	4.4	3.6	
<i>Chrysophyceae (Gulalgger)</i>									
<i>Aulacomas purdyi</i>	-	-	.1	-	-	-	-	-	
<i>Bitrichia chodatii</i>	-	-	-	-	-	.3	-	.3	
<i>Chromulina sp.</i>	3.3	.2	2.8	2.5	-	.2	.4	-	
<i>Chrysochraulina parva</i>	18.4	2.0	2.7	.9	6.7	4.2	9.2	2.6	
<i>Chrysolviks plancticus</i>	-	-	.1	-	-	-	-	-	
<i>Chrysolviks skujai</i>	.1	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Craspedonader</i>	.1	.1	-	.5	.8	-	1.7	.4	
<i>Cyster av Bitrichia chodatii</i>	-	-	-	-	-	-	1.1	-	
<i>Dinobryon bavaricum</i>	.1	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Dinobryon borgesi</i>	3.8	.8	1.1	.9	.8	-	.1	-	
<i>Dinobryon crenulatum</i>	8.2	-	-	-	.4	.8	.4	.4	
<i>Dinobryon sociale v.americana</i>	4.0	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Dinobryon suecicum</i>	2.4	.3	1.0	1.7	.6	.2	.3	.2	
<i>Kephriion littorale</i>	1.0	-	-	-	-	.3	-	-	
Lvse celler Dinobryon spp.	2.9	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Mallomonas akromos (v.parvula)</i>	.5	-	-	.5	.5	.4	.5	.4	
<i>Mallomonas cf.crassissima</i>	1.9	-	-	-	-	-	3.9	-	
<i>Mallomonas cf.waagensis</i>	1.7	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Mallomonas spp.</i>	-	-	-	-	2.0	2.0	-	.7	
<i>Ochromonas sp. (d=3.5-4)</i>	9.7	5.1	14.1	6.9	5.2	5.7	5.6	3.3	
<i>Pseudokephryion alaskanum</i>	-	-	-	.2	-	-	-	.2	
<i>Pseudokephryion entzii</i>	1.1	-	-	-	.1	.1	-	-	
Sea chrysomonader (?)	38.3	12.2	15.9	7.8	13.3	9.7	16.0	6.2	
<i>Spiniferomonas sp.</i>	3.6	-	.3	.8	.7	-	-	-	
<i>Stelloxomonas dichotoma</i>	-	-	.3	.8	-	-	-	-	
<i>Stichoglaea doederleinii</i>	.3	-	-	-	-	.3	-	-	
Store chrysomonader (?)	81.1	7.8	28.4	10.3	16.4	14.6	18.9	5.2	
Übest.chrysomonade (Ochromonas sp.?)	-	.3	3.7	1.3	-	.5	.3	1.3	
Übest.chrysophycee	-	-	.7	.5	.1	.1	-	-	
Sum	162.4	28.8	71.0	35.7	47.7	39.5	58.4	21.1	
<i>Bacillariophyceae (Kiselalgger)</i>									
<i>Asterionella formosa</i>	.4	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Cyclotella cf.glomerata</i>	3.5	1.7	2.6	3.5	2.4	.6	.5	1.9	
<i>Cyclotella comta</i>	-	-	-	1.2	4.2	1.2	4.5	.4	
<i>Cyclotella sp. (d=8-12,h=5-7)</i>	-	1.2	-	1.2	1.6	-	-	-	
<i>Melosira distans v.alpigena</i>	-	.4	1.0	2.4	2.2	3.2	.3	-	
<i>Melosira italica</i>	-	1.8	-	-	-	-	-	2.1	
<i>Melosira italica v.tenuissima</i>	-.5	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Rhizosolenia eriensis</i>	4.0	-	1.5	.9	-	-	.3	.6	
<i>Synecha sp. (I=30-40)</i>	-	-	1.1	-	-	-	-	-	
<i>Synecha sp. (I=50-80)</i>	10.2	2.8	.7	2.2	1.0	1.3	.2	.2	
Sum	18.1	8.4	6.8	11.5	11.4	6.4	5.8	5.2	
<i>Cryptophyceae</i>									
<i>Cryptomonas erosa v.reflexa (Cr.refl.)</i>	-	-	-	-	-	-	1.6	.7	
<i>Cryptomonas arronsoni</i>	.4	3.0	10.0	3.6	6.5	8.4	15.2	2.9	
<i>Cryptomonas sp. (I=20-22)</i>	-	-	3.2	-	-	-	3.2	3.4	
<i>Cryptomonas spp. (I=24-28)</i>	.8	6.0	6.4	2.4	6.0	3.2	5.2	-	
<i>Katablepharis ovalis</i>	4.5	1.2	9.5	4.1	2.6	4.1	1.4	1.9	
<i>Rhodomonas lacustris (v.nannoplantica)</i>	5.2	26.4	95.8	14.5	16.3	26.2	28.2	20.0	
Übest.cryptomonade (Chromonas sp.?)	-	-	4.0	2.3	2.0	1.3	2.4	2.3	
Sum	10.9	36.7	128.9	26.8	35.4	45.2	57.2	31.2	
<i>Dinophyceae (Fureflagellater)</i>									
<i>Gymnodinium cf.lacustre</i>	5.3	.9	4.6	4.0	3.7	2.0	4.6	1.0	
<i>Gymnodinium cf.uberium</i>	-	-	-	-	-	2.4	-	-	
<i>Gymnodinium helveticae f.achroum</i>	4.0	16.0	2.0	-	2.0	4.0	4.4	2.0	
<i>Gymnodinium sp. (I=15-16)</i>	3.0	.7	.4	1.0	3.4	2.6	2.2	.2	
<i>Peridinium inconspicuum</i>	.5	-	-	-	2.0	.6	8.8	.4	
Übest.dinoflagellat	2.8	-	1.9	.5	-	-	-	-	
Sum	15.7	17.6	8.9	5.5	11.1	11.7	20.0	3.6	
My-alger									
Sum	18.7	8.8	23.2	10.7	8.6	11.8	18.1	6.9	
Total	231.8	107.4	248.6	98.4	122.2	116.8	163.9	71.5	

4
Tabell Kvantitative planterplanktonprøver fra: Randsfjorden st.2 (bl.pr.0-10 m dyp)
Volum mm³/m³

GRUPPER/ARTER	Dato=>	900614	900626	900710	900723	900806	900821	900905	901002
Cyanophyceae (Blågrønalgger)									
Anabaena flos-aquae	-	-	-	-	-	.1	-	-	-
Merismopedia tenuissima	-	-	.2	-	-	-	-	-	-
Sum	-	-	.2	-	-	.1	-	-	-
Chlorophyceae (Grønalgger)									
Batrycoccus braunii	-	-	.6	-	.6	-	-	-	-
Carteria sp. (I=6-7)	-	-	.4	-	-	.7	-	.4	-
Chlaedononas sp. (I=8)	-	.5	-	-	.3	-	.5	-	-
Elakothrix gelatinosa (genevensis)	-	.2	.5	.3	-	.3	-	-	-
Gyromitus cordiformis	-	-	-	1.4	-	-	1.1	-	-
Kolliella sp.	.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Monoraphidium dybowskii	-	-	-	.2	-	.5	.5	.4	-
Monoraphidium griffithii	-	.2	.2	.5	.5	-	.8	-	-
Oocystis lacustris	-	-	-	.2	-	.2	-	-	-
Oocystis subarina v.varabilis	.4	.3	.7	1.5	1.2	1.5	2.1	1.3	-
Platomas sp.	-	-	-	-	-	.6	-	-	-
Scenedesmus denticulatus v.linearis	1.1	.1	1.3	-	-	-	-	-	-
Scenedesmus sp.	1.1	1.0	.2	.8	-	.4	.6	.2	-
Scourfieldia cordiformis	.2	-	.2	-	-	.4	-	-	-
Tetraedron minium v.tetralobulatum	2.4	1.9	1.1	-	.9	.8	.8	.3	-
Übest.cocc.gr.alga (Chlorella sp.?)	-	-	-	-	-	-	.6	-	-
Übest.gr.flagellat	-	.2	-	-	-	.6	-	-	-
Sum	5.1	4.4	5.2	4.9	3.5	5.9	7.0	2.6	-
Chrysophyceae (Gulalgger)									
Birchilia chodatii	-	-	-	-	-	.3	.3	-	-
Chroomialia sp.	1.0	1.3	.2	.6	-	.2	1.3	.5	-
Chrysidiastrum catenatum	.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrysocaulina parva	11.7	7.1	1.0	.3	2.2	9.8	1.8	-	-
Chrysococcus minutus	-	-	-	-	-	.3	-	-	-
Chrysococcus minutus	-	-	-	-	-	-	.5	.2	-
Craspedodinader	-	.1	.3	.4	.5	-	.5	3.2	-
Cyster av Birchilia chodatii	-	-	-	-	-	-	.2	-	-
Cyster av Chrysolykta skjæl	-	-	.3	-	.6	.3	-	-	-
Dinobryon bavaricum	.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinobryon borgei	2.3	3.8	1.3	.2	.8	.8	.5	-	-
Dinobryon crenulatum	.7	.8	-	-	.4	-	.4	-	-
Dinobryon divergens	5.2	.5	.3	-	-	-	-	-	-
Dinobryon sociale v.americana	.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinobryon suecicum	1.7	.6	.2	.3	.3	-	.2	-	-
Kephvion littorale	.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Lise celle Dinobryon spp.	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Mallomonas akromensis (v.parvula)	-	.5	.4	-	-	1.1	.5	.8	-
Mallomonas cf.crassisquamata	-	-	2.1	-	-	-	3.4	-	-
Mallomonas cf.maiorense	-	.9	-	-	-	-	-	-	-
Mallomonas spp.	1.7	3.2	-	1.6	-	-	-	-	-
Ochromonas sp. (d=3.5-4)	10.7	5.6	11.2	4.5	7.7	4.1	5.6	3.9	-
Phaeaster aphanaster	-	.5	-	-	-	-	-	-	-
Pseudokephvion entzii	-	.4	.1	-	1.1	.3	.3	.4	-
Pseudopedinella sp.	-	-	-	-	-	.4	-	-	-
Sæa chrysomonaer (?)	15.9	14.1	16.5	5.9	9.3	9.5	8.6	7.8	-
Spiniferonas sp.	1.0	.5	-	-	.2	-	-	-	-
Steloxenonas dichotoma	-	-	-	.3	-	-	-	-	-
Store chrysomonaer (?)	34.5	21.5	5.2	10.3	12.9	9.5	12.9	7.8	-
Übest.chrysomonaer (Ochromonas sp.?)	.5	.5	10.3	1.1	-	.3	1.6	-	-
Übest.chrysophyceae	-	-	1.6	1.1	.1	.3	-	-	-
Uroglenna americana	4.5	3.2	1.5	.9	.9	-	-	-	-
Sum	94.1	65.1	52.4	27.4	37.2	37.0	38.5	24.5	-
Bacillariophyceae (Kiselalgger)									
Asterionella formosa	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-
Cyclotella cf.globulifera	.5	1.9	3.4	.7	1.1	.2	2.3	.7	-
Cyclotella comta	.5	-	-	-	2.6	4.0	3.0	1.3	-
Cyclotella sp. (d=8-12,h=5-7)	1.2	1.3	-	1.2	.9	-	1.1	-	-
Diatomella elongata	.8	-	-	-	-	-	-	-	-
Melosira distans v.alpigena	1.0	.7	.2	2.5	.8	2.2	1.3	1.4	-
Melosira italica	1.4	-	-	.5	-	-	-	-	-
Melosira italica v.tenuissima	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Rhizosolenia eriensis	.2	.6	.2	.4	.2	-	-	.2	-
Synedra sp. (I=50-80)	7.4	2.2	1.1	.7	-	-	-	.4	-
Tabellaria fenestrata	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	21.5	6.7	4.9	6.0	5.6	6.5	7.7	3.9	-
Cryptophyceae									
Cryptomonas erosa	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-
Cryptomonas marssonii	1.4	10.0	9.8	2.9	1.5	3.5	2.5	-	-
Cryptomonas sp. (I=15-18)	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-
Cryptomonas sp. (I=20-22)	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	-
Cryptomonas spp. (I=24-28)	3.6	10.4	1.2	3.6	4.4	4.0	1.6	2.0	-
Katablepharis ovalis	3.0	8.6	9.8	1.2	15.4	5.2	3.8	.7	-
Rhodomonas lacustris (v.nannoplantica)	27.4	38.5	61.2	15.4	24.5	26.5	35.1	.3	-
Übest.cryptomonade (Ochromonas sp.?)	-	2.0	4.0	.5	-	2.1	1.7	-	-
Übest.cryptomonade (I=6-8) Chro.acuta ?	.2	-	.2	-	-	-	-	-	-
Sum	35.6	65.5	87.2	21.5	45.8	41.4	50.3	6.2	-
Dinophyceae (Fureflagellater)									
Gymnodinium cf.lacustre	1.0	2.8	-	-	1.1	1.1	2.8	1.0	-
Gymnodinium cf.uberrium	-	-	-	-	2.4	4.8	-	2.4	-
Gymnodinium helveticum f.aichroum	4.0	6.0	-	6.0	-	2.0	4.0	-	-
Gymnodinium sp. (I=15-16)	-	1.9	.6	.5	1.1	2.4	.7	.2	-
Peridinium inconspicua	-	.4	-	.4	-	-	-	-	-
Übest.dinoflagellat	-	.4	.5	-	.8	1.2	1.7	-	-
Sum	5.0	11.5	1.1	6.9	5.3	11.5	9.2	3.6	-
My-alger									
Sum	18.0	11.7	13.6	8.0	14.0	15.7	16.9	5.9	-
Total	179.3	168.8	164.6	74.6	111.3	118.0	129.4	46.8	-

4
Tabell Kvantitative plantoplanktonprøver fra Randsfjorden st.3 (bl.pr.0-10 m dyp)
Volum mm³/m³

GRUPPER/ARTER	Dato=>	900614	900626	900710	900723	900806	900821	900905	901002
<i>Cyanophyceae (Blågrønalgger)</i>									
Anabaena flos-aquae	-	-	-	,3	-	,3	-	-	-
Chroococcus minutus	-	-	-	,2	-	-	,7	,1	
Sum	-	-	-	,5	-	,3	,7	,1	
<i>Chlorophyceae (Grønalgger)</i>									
Batrachosphaera brunnei	-	-	-	4,0	-	-	,6	,6	
Chlaetomonas sp. (1=8)	-	-	-	,3	-	,5	-	-	
Coelastrum microporum	-	-	-	-	-	,4	-	-	
Elakothrix gelatinosa (genevensis)	-	-	,3	,4	,3	,2	-	-	
Eudorina elegans	-	,2	-	-	-	-	-	-	
Sironia cordiformis	-	-	-	-	1,5	-	-	1,4	
Monoraphidium dybowskii	,3	-	,2	,5	,2	,5	,4	,6	
Monoraphidium griffithii	-	-	-	,2	,2	-	,5	-	
Nephrocystis agardhianus	-	-	-	,2	-	-	-	-	
Oocystis lacustris	-	-	-	-	,2	-	-	-	
Oocystis subarina v. variabilis	1,0	,4	,5	,7	,3	1,2	1,5	1,3	
Paramecium conifera	,8	-	-	-	-	-	1,1	-	
Quadrigula korschikovii	-	-	,3	-	-	-	-	-	
Scenedesmus denticulatus v.linearis	,8	-	-	,1	,2	-	-	-	
Scenedesmus sp.	2,4	2,0	,7	2,1	2,4	,8	1,0	,4	
Scurfieldia cordiformis	-	-	,3	-	-	,8	-	-	
Sphaerocystis schroeteri	-	-	,5	,3	-	-	-	-	
Tetraedron minimum v.tetralobulatum	6,8	,7	3,3	2,0	2,0	,9	,1	1,2	
Ubest.cocc.or.alge (Chlorella sp.?)	-	-	-	1,3	-	-	-	-	
Ubest.gr.flagellat	-	-	-	-	,9	-	-	-	
Sum	12,0	3,4	6,2	12,1	8,1	5,4	5,1	5,5	
<i>Chrysophyceae (Gullalger)</i>									
Bitrichia chodatii	-	-	-	-	-	,3	,8	-	
Chromalina sp.	1,3	-	1,2	3,7	,5	,4	-	-	
Chrysidiastrum catenatum	,4	-	-	-	-	-	-	-	
Chrysochromalina parva	14,1	,2	1,9	1,1	3,1	9,0	1,5	5,8	
Chrysococcus minutus	-	-	-	-	-	,2	-	-	
Chrysvolvkos planctonicus	,1	-	-	-	-	-	-	,2	
Chrysvolvkos skujai	,3	-	,1	,3	-	-	-	-	
Craspedoniodader	-	,5	-	-	,3	-	,4	1,5	
Cyster av Chrysvolvkos skujai	-	,5	,3	-	-	,1	-	-	
Cyster av chrysophyceer	,3	-	-	-	-	-	-	-	
Dinobryon borgesi	5,4	-	,5	3,0	,7	,4	-	-	
Dinobryon crenulatum	7,4	-	-	-	-	,4	-	-	
Dinobryon sociale v.americanae	5,6	-	-	-	-	-	-	-	
Dinobryon sueicum	2,1	,2	,8	-	1,0	,5	,3	-	
Kephryn litorale	,2	-	-	-	-	-	-	-	
Læse celle Dinobryon spp.	2,6	-	-	-	-	-	-	-	
Mallomonas akrotomes (v.parvula)	-	-	,5	,3	,4	-	-	,5	
Mallomonas cf.crassissima	-	-	2,1	-	-	2,3	,2	2,1	
Mallomonas cf.maiorenensis	3,4	-	-	-	-	-	-	-	
Mallomonas spp.	4,0	-	-	-	-	-	-	-	
Ochromonas sp. (d=3,5-4)	14,0	3,4	8,5	11,1	5,7	9,0	9,9	2,3	
Phaeaster aphanaster	-	-	-	,4	-	,4	-	-	
Pseudokephrynion entzii	,3	-	-	-	-	,3	,3	-	
Pseudokephrynion sp.	-	-	-	-	-	,2	,5	,3	
Pseudopediastrum sp.	-	-	-	-	-	,1	-	-	
Sma chrysomonader (?)	30,7	4,0	10,7	19,3	9,3	14,1	14,1	7,0	
Spiniferomonas sp.	1,7	-	-	,7	,2	,3	-	-	
Stekixononas dichotoma	-	,4	,8	,4	-	-	-	-	
Store chrysomonader (?)	56,8	6,0	7,8	24,1	12,1	24,1	16,4	8,6	
Ubest.chrysomonade (Ochromonas sp.?)	,3	,5	-	1,1	,5	,5	-	,3	
Ubest.chrysophyce	-	-	,1	,4	,7	-	-	,3	
Uroglena americana	2,1	-	-	-	-	-	-	-	
Sum	153,2	15,7	35,2	65,9	34,4	63,5	44,4	28,8	
<i>Bacillariophyceae (Kiselalger)</i>									
Asterionella formosa	,7	,4	-	-	-	-	-	-	
Cyclotella cf.globoidea	3,2	-	,9	5,7	2,8	,8	-	,2	
Cyclotella costata	-	-	-	,9	,9	3,1	1,7	3,0	
Cyclotella sp. (d=8-12,h=5-7)	-	-	-	2,5	1,3	-	-	4,8	
Melosira distans v.alpigena	,4	2,1	1,6	,2	2,2	1,6	-	1,5	
Melosira islandica ssp. helvetica	-	5,4	-	-	-	-	-	-	
Melosira italica	-	76,3	-	-	-	-	-	1,9	
Melosira italica v.tenuissima	-	22,2	-	-	-	-	-	,5	
Rhizosolenia eriensis	1,8	,4	-	,3	,4	-	,4	1,0	
Synedra sp. (l=50-80)	7,5	-	2,8	,3	,4	,3	,1	,2	
Sum	135,5	106,8	5,3	9,9	8,0	5,8	2,1	13,2	
<i>Cryptophyceae</i>									
Cryptaxas vulgaris	-	,7	-	-	-	-	-	-	
Cryptomonas erosa	-	-	-	3,2	-	-	-	-	
Cryptomonas erosa v.reflexa (Cr.refl.?)	-	-	-	-	1,1	-	,7	-	
Cryptomonas warssoni	,8	4,3	7,6	4,3	4,0	10,1	5,6	9,5	
Cryptomonas spp. (l=24-28)	1,6	8,1	8,8	2,4	8,0	5,6	6,0	6,8	
Katablepharis ovalis	7,4	-	4,3	8,5	2,1	1,2	3,1	1,7	
Rhodomonas lacustris (+v.nannoplantica)	2,2	10,2	48,2	31,1	13,7	49,8	26,5	17,4	
Ubest.cryptomonade (Chromonas sp.?)	-	-	1,0	11,3	1,3	4,2	3,4	1,5	
Ubest.cryptomonade (l=6-8) Chro.acuta ?	-	-	,2	-	-	-	-	-	
Sum	12,0	23,3	70,1	60,8	30,3	71,0	45,4	36,9	
<i>Dinophyceae (Flagellater)</i>									
Gymnodinium cf.lacustre	25,8	1,1	3,0	5,6	2,1	5,3	2,1	,9	
Gymnodinium helveticum f.achrous	10,0	8,0	4,4	-	2,0	8,8	-	6,6	
Gymnodinium sp. (l=15-16)	-	-	3,0	1,1	3,8	3,6	2,5	3,2	
Peridinium inconspicuum	-	-	-	-	,4	9,4	10,8	-	
Ubest.dinoflagellat (l=12,b=10)	2,7	-	-	-	-	-	-	-	
Ubest.dinoflagellat	2,1	-	3,2	2,8	1,6	,8	1,6	-	
Sum	40,6	9,1	13,6	9,4	10,0	27,9	17,0	10,7	
<i>My-alger</i>									
Sum	19,3	7,5	11,6	10,4	11,0	15,6	24,8	9,0	
Total	250,7	165,8	142,0	168,9	101,8	189,3	139,5	104,2	

Tabel 4. Kvantitative plantepaplanktonprøver fra Randsfjorden st.4 (bl.pr.0-10 m dyp)
Volum mm³/m³

GRUPPER/ARTER	Date=	900614	900626	900710	900723	900806	900821	900905	901002
<i>Cyanophyceae</i> (Blågrønalgger)									
<i>Chroococcus minutus</i>	-	-	-	-	.1	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	.1	-	-	-	-
<i>Chlorophyceae</i> (Grønnalger)									
<i>Batrachococcus braunii</i>	-	-	-	.6	-	-	-	-	-
<i>Chlaetothrix gelatinosa</i> (Genevensis)	-	.2	-	-	.3	.3	-	.3	-
<i>Gymnoriztis cordiformis</i>	-	-	-	1.4	1.3	1.3	-	-	-
<i>Kolliella</i> sp.	-	-	-	-	.1	-	-	-	-
<i>Monoraphidium dubowskii</i>	-	-	-	.2	.2	.3	.4	-	-
<i>Monoraphidium griffithii</i>	.3	-	.5	-	.3	.2	.3	.3	-
<i>Oocystis lacustris</i>	-	-	.1	-	-	-	-	-	-
<i>Oocystis subarina v.varabilis</i>	.5	.3	.5	3.2	1.0	1.9	1.1	.4	-
<i>Senedesmus denticulatus v.linearis</i>	-	.1	-	.3	.1	-	-	-	-
<i>Scenedesmus</i> sp.	1.3	3.0	1.0	.6	1.0	.7	.5	1.0	-
<i>Scourfieldia cordiformis</i>	.2	-	.1	-	-	.2	.2	-	-
<i>Sphaerocystis schroeteri</i>	-	-	-	-	-	-	-	.2	-
<i>Tetraedron minima v.tetralobulatum</i>	3.7	2.5	-	2.5	2.2	1.7	.3	1.1	-
Übest.cocc.gr.alge (Chlorella sp.?)	-	-	-	-	.2	-	-	-	-
Übest.gr.flagellat	-	-	-	-	.2	-	-	-	-
Sum	6.0	6.0	2.4	8.8	6.8	6.9	3.0	3.2	-
<i>Chrysophyceae</i> (Gulalger)									
<i>Bitrichia chodatii</i>	-	-	-	-	-	.3	.3	-	-
<i>Chromulina</i> sp.	-	1.1	.5	.6	.7	1.0	-	-	-
<i>Chrysochromulina parva</i>	14.1	5.0	11.1	.3	3.5	5.1	-	3.5	-
<i>Chrysococcus minutus</i>	.4	-	-	-	-	-	.4	-	-
<i>Chrysolyskos plancticus</i>	.1	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Chrysolyskos skujai</i>	.1	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Craspedonanader</i>	.3	-	.1	.4	.1	.3	1.6	1.3	-
Cyster av <i>Bitrichia chodatii</i>	-	-	-	-	-	-	.3	-	-
Cyster av <i>Chrysokysis skujai</i>	-	-	-	-	.4	-	-	-	-
Cygar av chrysophyceer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Dinobryon borgei</i>	4.3	1.8	.5	.5	.7	.4	-	-	-
<i>Dinobryon crenulatum</i>	.7	2.0	.4	-	.4	-	.8	-	-
<i>Dinobryon sociale v.americanum</i>	3.7	-	.4	-	-	-	-	-	-
<i>Dinobryon suecicum</i>	2.9	2.2	.3	.3	.5	.3	-	.2	-
<i>Kephryion litorale</i>	.3	-	-	-	-	-	.2	-	-
Lise celle <i>Dinobryon</i> spp.	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Mallomonas akrokoenos</i> (v.parvula)	-	-	.4	.5	.5	.4	-	-	-
<i>Mallomonas caudata</i>	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-
<i>Mallomonas cf.crassisquama</i>	-	-	-	-	-	2.4	2.1	-	-
<i>Mallomonas cf.maiorense</i>	.9	-	.9	-	-	.9	-	-	-
<i>Mallomonas</i> spp.	-	-	-	-	-	1.6	-	2.0	-
<i>Ochromonas</i> sp. (d=3.5-4)	10.0	5.9	6.2	4.7	4.5	5.1	5.1	2.0	-
<i>Pseudokephryion alaskanus</i>	-	-	-	-	-	-	.2	-	-
<i>Pseudokephryion entzii</i>	.3	-	-	.1	.3	-	.1	-	-
<i>Pseudokephryion</i> sp.	-	.2	-	-	-	-	-	-	-
<i>Pseudopedinella</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	.3	-
Sei chrysomonader (?)	19.8	8.3	17.4	6.5	7.6	12.3	11.9	5.0	-
<i>Spiniferomonas</i> sp.	4.0	.5	-	.2	.5	-	-	.3	-
<i>Stekelomonas dichotoma</i>	-	-	.3	.8	-	-	-	-	-
Store chrysomonader (?)	52.5	14.6	18.1	9.5	9.5	17.2	18.1	6.0	-
Übest.chrysomonade (Ochromonas sp.?)	.3	.5	4.0	1.6	.8	1.6	.3	-	-
Übest.chrysophyce	-	-	.2	1.1	.3	-	-	-	-
Uroplena americana	.5	1.3	-	-	-	-	-	-	-
Sum	117.6	43.8	50.8	28.5	31.9	47.5	41.2	20.6	-
<i>Bacillariophyceae</i> (Kiselalger)									
<i>Asterionella formosa</i>	4.0	-	-	.2	-	-	-	-	-
<i>Cyclotella cf.globiformata</i>	.7	2.1	1.1	4.3	.4	.2	-	.7	-
<i>Cyclotella conta</i>	-	-	-	1.0	4.4	2.2	1.7	.9	-
<i>Cyclotella</i> sp. (d=8-12, h=5-7)	-	1.2	.2	.7	-	-	.5	3.7	-
<i>Meiosira distans v.alpigena</i>	.8	1.1	1.4	2.5	.9	1.8	.3	1.6	-
<i>Meiosira italica</i>	.4	-	-	-	-	-	-	1.2	-
<i>Rhizosolenia eriensis</i>	1.4	1.2	.2	-	-	-	.4	.4	-
<i>Synedra</i> sp. (l=50-80)	10.2	1.8	1.2	.8	-	.5	.4	.8	-
<i>Tabellaria fenestrata</i>	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	18.6	7.5	4.0	9.5	5.6	4.7	3.2	9.3	-
<i>Cryptophyceae</i>									
<i>Cryptomonas erosa</i>	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-
<i>Cryptomonas erosa v.reflexa</i> (Cr.refl.?)	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-
<i>Cryptomonas marssonii</i>	1.6	4.7	7.7	3.6	6.3	6.1	-	10.9	-
<i>Cryptomonas</i> sp. (l=15-18)	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-
<i>Cryptomonas</i> sp. (l=20-22)	-	-	6.4	3.2	-	-	-	-	-
<i>Cryptomonas</i> sp. (l=24-28)	3.2	1.6	6.4	4.0	5.6	4.8	2.0	12.4	-
<i>Katablepharis ovalis</i>	4.3	2.7	4.8	1.8	7.9	2.9	1.4	.8	-
<i>Rhodomonas lacustris</i> (+v.nannoplantica)	3.2	18.6	45.0	21.9	19.3	27.8	1.3	20.8	-
Übest.cryptomonade (Chromonas sp.?)	-	-	1.7	6.8	1.7	1.7	-	5.2	-
Sum	12.3	27.6	70.0	41.3	41.8	43.3	4.8	54.8	-
<i>Dinophyceae</i> (Fureflagellarer)									
<i>Gyrodinium</i> cf. <i>lacustre</i>	13.8	4.2	2.8	3.0	4.2	5.0	2.1	2.1	-
<i>Gyrodinium helveticum</i> f. <i>achroum</i>	6.0	4.4	2.0	-	6.0	-	-	13.2	-
<i>Gyrodinium</i> sp. (l=15-16)	1.7	1.4	2.4	3.2	5.7	4.2	1.1	1.7	-
<i>Gyrodinium</i> <i>übericum</i>	-	-	-	-	-	2.4	-	7.2	-
<i>Peridinium</i> <i>inconspicuum</i>	-	-	-	-	-	1.6	1.6	.8	-
Übest.dinoflagellat (l=12, b=10)	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Übest.dinoflagellat	2.7	-	.4	.7	.5	-	-	-	-
Sum	26.8	10.1	7.6	6.8	16.4	13.2	4.8	25.0	-
<i>My-alger</i>									
Sum	18.2	10.0	15.3	12.2	16.0	14.0	8.4	7.7	-
Total	199.4	105.0	150.0	107.1	118.7	129.6	65.4	120.6	-

4
 Tabell ... Kvantitative olanteplanktonprøver fra: Randsfjorden st.5 (bl.or.0-10 m dyp)
 Volum mm³/m³

GRUPPER/ARTER	Dato=>	900614	900626	900710	900723	900806	900821	900905	901002
<i>Cyanophyceae (Blågrønalgger)</i>									
Anabaena flos-aquae	-	-	-	-	.1	.3	-	-	-
Chroococcus minutus	-	-	-	.2	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	.2	.1	.3	-	-	-
<i>Chlorophyceae (Grønalger)</i>									
Carteria sp. (I=6-7)	-	-	-	-	-	.8	-	.3	-
Chlamydomonas sp. (I=8)	-	-	.3	-	-	.5	.3	-	-
Dictyosphaerium pulchellum v. minutum	-	-	-	-	-	.3	-	-	-
Elakatothrix gelatinosa (genevensis)	.2	-	.5	-	.2	.2	-	.2	-
Gromitius cordiformis	2.9	-	-	2.7	1.3	-	1.2	-	-
Monoraphidium dybowskii	.3	-	.2	-	.9	.9	.2	-	-
Monoraphidium griffithii	-	-	.2	-	-	.3	-	-	-
Nephryctium agarhinianum	-	-	-	-	.4	-	-	-	-
Oocystis lacustris	-	-	1.0	.1	-	.2	-	-	-
Oocystis subarina v. variabilis	.2	1.7	1.7	1.9	.5	.7	1.3	1.5	-
Quadriguila korschikovii	-	-	-	-	-	-	.1	-	-
Scenedesmus denticulatus v. linearis	-	-	-	.2	.1	-	.1	-	-
Scenedesmus sp.	.8	1.9	1.2	.6	.4	-	-	1.3	-
Scourfieldia cordiformis	.2	.2	-	-	.2	.2	.2	-	-
Sphaerocystis schroeteri	-	-	-	-	.2	-	-	.3	-
Tetraedron minium v. tetralobatum	1.7	2.1	2.9	1.2	.7	.7	.3	.5	-
Übest.gr.flagellat	-	-	-	-	-	2.6	-	-	-
Sum	6.4	5.9	8.0	6.6	4.9	7.2	3.6	4.1	-
<i>Chrysophyceae (Gulalger)</i>									
Bitrichia chodatii	-	-	-	-	.3	-	-	-	-
Chromalina sp.	.5	1.1	1.1	-	1.9	-	-	-	-
Chrysidiastrum catenatum	-	-	-	.4	-	-	-	-	-
Chrysochromalina parva	7.4	6.6	.9	.2	3.0	6.6	1.8	1.1	-
Chrysolykos skujai	-	.1	-	-	-	-	-	-	-
Craspedonemaader	.1	-	.3	1.1	.5	.4	1.1	2.3	-
Cyster av Bitrichia chodatii	-	-	-	-	-	-	.5	-	-
Cyster av Chrysolykos skujai	-	-	.3	-	.3	.3	-	.3	-
Dinobryon bavaricum	.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinobryon boregi	1.7	2.7	.4	.1	.6	-	-	.2	-
Dinobryon crenulatum	.8	1.6	-	-	.8	-	.4	-	-
Dinobryon cylindricum	-	-	-	.1	-	-	-	-	-
Dinobryon divergens	5.7	.4	-	.2	-	-	-	-	-
Dinobryon sociale v. americanum	.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinobryon succicuum	1.4	.6	.3	.2	.6	.2	-	.2	-
Kephryion litorale	.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Løse celle Dinobryon spp.	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-
Mallomonas akromos (v. parvula)	-	.5	.5	.5	.5	.9	.8	-	-
Mallomonas caudata	-	-	-	2.7	-	-	-	-	-
Mallomonas spp.	-	4.0	-	1.6	-	-	1.7	2.3	-
Ochromonas sp. (d=3.5-4)	8.2	6.3	7.3	3.6	5.0	1.4	6.4	2.0	-
Pseudokephryion entzii	-	.1	.3	-	.7	.4	.3	.4	-
Pseudopediastrum sp.	-	-	-	-	.7	.3	-	-	-
Sma chrysomonader (?)	14.5	10.5	10.5	4.1	9.1	4.0	11.0	9.0	-
Spiniferomonas sp.	.7	.8	-	-	1.3	-	-	.2	-
Stevensonias dichotoma	.3	-	-	.7	-	-	-	-	-
Stora chrysomonader (?)	38.8	24.1	9.5	6.9	15.5	6.0	9.5	12.1	-
Übest.chrysomonade (Ochromonas sp.?)	.3	-	4.5	1.1	.3	1.1	.3	-	-
Übest.chrysophyce	-	-	.8	.7	.3	.5	.3	-	-
Uroglena americana	3.4	3.1	.5	-	-	-	-	-	-
Sum	88.0	62.4	37.2	24.0	41.3	22.1	33.9	29.9	-
<i>Bacillariophyceae (Kiselalger)</i>									
Asterionella formosa	13.5	-	-	-	-	-	-	-	-
Cyclotella cf.gloerata	1.5	3.1	.4	.9	1.0	.6	.4	.2	-
Cyclotella comta	-	-	.4	-	.4	2.0	2.2	.5	-
Cyclotella sp. (d=8-12,h=5-7)	1.2	-	.2	.4	1.9	-	1.5	1.6	-
Melosira distans v.ipigema	.6	.7	2.1	1.0	.4	.5	.7	.9	-
Melosira italica	3.1	-	-	.3	-	-	-	-	-
Melosira italica v.tenuissima	.8	-	-	-	-	-	-	.5	-
Rhizosolenia ericiensis	.4	.4	-	.6	.2	-	-	-	-
Synedra sp. (I=50-80)	3.0	2.2	.4	1.4	.3	.2	-	.5	-
Tabellaria fenestrata	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	32.2	6.4	3.5	4.6	4.2	3.3	4.8	4.2	-
<i>Cryptophyceae</i>									
Cryptaulax vulgaris	-	-	-	.3	-	-	-	.5	-
Cryptomonas erosa	-	-	-	-	-	.5	.5	-	-
Cryptomonas erosa v.reflexa (Cr.refl.?)	-	-	-	-	-	-	.6	1.1	-
Cryptomonas marssonii	1.1	-	8.3	3.6	2.9	3.2	5.1	1.5	-
Cryptomonas sp. (I=20-22)	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	-
Cryptomonas spp. (I=24-28)	4.0	.4	2.4	4.8	.8	.8	4.8	8.8	-
Katablepharis ovalis	2.1	3.8	10.3	1.4	11.0	5.1	1.9	1.7	-
Rhodomonas lacustris (v.nannoplantica)	18.6	16.3	64.6	21.9	24.9	17.1	20.4	1.3	-
Übest.cryptomonade (Cryptomonas sp.?)	-	.2	4.5	-	-	.5	2.4	1.6	-
Übest.cryptomonade (Chroacuta ?)	-	-	-	-	-	-	.2	-	-
Sum	25.7	20.7	90.0	32.0	39.5	25.2	39.1	19.7	-
<i>Dinophyceae (Fureflagellater)</i>									
Gymnodinium cf.lacustre	2.8	-	1.9	-	1.9	3.2	1.9	-	-
Gymnodinium helveticum f.achroue	8.0	-	1.6	8.0	-	6.0	2.0	-	-
Gymnodinium sp. (I=15-16)	-	-	-	.7	.5	.5	.8	1.0	-
Peridinium inconspicuum	.4	-	-	-	.4	-	.4	-	-
Übest.dinoflagellat	-	.8	.8	.5	.9	-	-	-	-
Sum	11.2	.8	4.3	9.3	3.7	9.7	5.1	1.0	-
<i>My-alger</i>									
Sum	12.0	19.1	13.0	5.7	12.6	11.6	20.2	8.9	-
Total	175.5	115.3	156.0	82.2	106.2	79.2	106.8	67.8	-

Tabel 4. Kvantitative plantoplanktonprøver fra: Randsfjorden st.6 (bl.pr.0-10 m dve)
Volum mm³/m³

GRUPPER/ARTER	Dato >	900614	900626	900710	900723	900806	900821	900905	901002
<i>Cyanophyceae</i> (Blågrønalgger)									
<i>Anabaena flos-aquae</i>	-	-	-	-	.3	.3	1.7	-	-
<i>Gomphosphaeria lacustris</i>	-	-	-	-	.2	-	-	-	-
<i>Merismopedia tenuissima</i>	-	-	.2	-	-	-	-	-	-
Sum	-	-	.2	-	.5	.3	1.7	-	-
<i>Chlorophyceae</i> (Grønalgger)									
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	-	.5	-	-	-	-	-	-	-
<i>Batravoccus braunii</i>	-	-	-	-	-	.6	.6	-	-
<i>Chlaetomonas sp.</i> (I=12)	-	-	-	-	-	1.6	1.6	-	-
<i>Chiaydomonas sp.</i> (I=10)	-	-	-	.9	-	-	-	-	-
<i>Chiaydomonas sp.</i> (I=8)	-	-	-	-	-	.5	-	.3	-
<i>Cosmarium depressum</i>	-	-	-	-	-	.5	-	-	-
<i>Crucigenia quadrata</i>	-	-	-	-	-	-	-	.3	-
<i>Elakatobrix gelatinosa</i> (genevensis)	-	-	.2	.2	.1	.2	.2	.4	-
<i>Eudorina elegans</i>	.3	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Gymnostis cordiformis</i>	1.3	1.2	2.9	-	1.2	1.4	1.2	1.3	-
<i>Koliella sp.</i>	-	-	-	.1	.1	-	-	-	-
<i>Monoraphidium dybowskii</i>	-	.5	-	-	1.6	2.1	.5	.9	-
<i>Monoraphidium griffithii</i>	-	-	-	.2	.2	.3	1.3	-	-
<i>Oocystis lacustris</i>	-	-	-	-	.2	-	-	-	-
<i>Oocystis subarina v.variabilis</i>	.5	.4	.5	2.4	1.7	.8	.8	.5	-
<i>Paramastix conifera</i>	-	-	-	-	-	-	-	.8	-
<i>Pediastrum tetras</i>	-	-	.4	-	-	.4	-	-	-
<i>Quadrigula korschikovii</i>	-	-	-	-	-	.1	-	-	-
<i>Scedesmus denticulatus v.linearis</i>	-	-	-	-	-	.1	-	-	-
<i>Scedesmus sp.</i>	-	-	-	-	-	.6	-	-	-
<i>Scurfieldia cordiformis</i>	.2	.2	-	-	-	.2	.3	-	-
<i>Spondivisia planum</i>	-	.5	.6	-	.4	-	-	-	-
<i>Tetraedron caudatum</i>	-	-	-	-	.4	-	-	-	-
<i>Tetraedron miniatum v.tetralobulatum</i>	-	-	-	-	1.5	.3	.3	-	-
<i>Ubest.cocc.gr.alge</i> (<i>Chlorella sp.?</i>)	.6	-	-	-	-	-	.3	-	-
<i>Ubest.gr.flagellat</i>	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-
Sum	2.9	2.9	4.6	3.8	8.0	10.8	7.0	4.5	-
<i>Chrysophyceae</i> (Gullalger)									
<i>Bitrichia chodatii</i>	-	.3	-	.3	-	.8	.3	.3	-
<i>Chromulina sp.</i>	4.0	2.1	1.6	3.7	-	1.0	1.1	.5	-
<i>Chromulina sp.</i> (Chr.pseudonebulosa ?)	-	.2	-	.1	-	-	-	-	-
<i>Chrysidiastrum catenatum</i>	.4	-	-	.4	-	-	-	-	-
<i>Chrysocbraulina parva</i>	.3	3.7	1.1	-	1.7	8.9	1.2	-	-
<i>Chrysococcus cordiformis</i>	-	-	-	-	-	-	.3	-	-
<i>Chrysolykos plancticus</i>	-	-	-	-	.2	-	.2	-	-
<i>Chrysolykos skujae</i>	-	.3	.2	.2	-	-	-	-	-
<i>Craspedonader</i>	1.7	1.3	2.4	.6	.3	.1	.9	2.4	-
<i>Cyster av Bitrichia chodatii</i>	.3	.5	-	-	-	-	-	-	-
<i>Cyster av Chrysolykos skujae</i>	-	-	-	-	.3	.6	-	-	-
<i>Cyster av chrysophyceer</i>	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-
<i>Dinobryon bavaricum</i>	6.3	2.2	.2	.1	-	-	-	-	-
<i>Dinobryon borgei</i>	2.8	1.3	.1	1.3	.3	1.3	.1	.2	-
<i>Dinobryon crenulatum</i>	.4	.8	.4	.8	-	.8	1.2	.4	-
<i>Dinobryon cylindricum</i>	.1	.5	.3	.1	-	-	-	-	-
<i>Dinobryon divergens</i>	41.0	24.8	28.2	2.6	.1	-	-	-	-
<i>Dinobryon sertularia</i>	-	-	.7	.4	-	-	-	-	-
<i>Dinobryon sueicum</i>	1.0	.6	.6	.9	.5	.6	.7	-	-
<i>Kephryion litorale</i>	-	-	-	-	.2	-	-	-	-
<i>Lisea celler</i> Dinobryon spp.	.8	.4	.8	-	-	-	-	-	-
<i>Malloomas akrotokos</i> (v.parvula)	-	.9	-	-	.5	-	.9	2.0	-
<i>Malloomas caudata</i>	-	-	-	-	.8	.8	1.4	1.0	-
<i>Malloomas cf.cassiskwama</i>	.7	1.9	-	-	-	-	2.3	-	-
<i>Malloomas cf.aiorenensis</i>	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-
<i>Malloomas spp.</i>	-	-	2.3	6.4	-	-	2.0	2.3	-
<i>Ochromonas sp.</i> (d=3.5-4)	16.7	13.6	6.9	12.2	5.1	6.5	4.4	2.9	-
<i>Phaeaster anphanaster</i>	-	.4	-	-	-	-	-	-	-
<i>Pseudokephryion entzii</i>	.5	-	.1	.3	.3	-	.5	.1	-
<i>Pseudopedinella sp.</i>	-	.3	-	-	-	-	-	.3	-
<i>Sma chrysomader</i> (<7)	25.9	23.9	16.0	22.2	9.1	8.4	7.1	7.1	-
<i>Spiniferomas sp.</i>	.3	-	.8	-	-	-	-	-	-
<i>Stekoxomas dichotoma</i>	-	.3	-	.4	-	-	-	.4	-
<i>Stichoglossa doederleinii</i>	-	-	.6	-	-	.3	-	-	-
<i>Stora chrysomader</i> (>7)	39.6	27.6	30.1	28.4	17.2	25.0	8.6	12.9	-
<i>Synura sp.</i> (I=9-11,b=8-9)	-	.7	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ubest.chrysomade</i> (Ochromonas sp.?)	.5	-	-	.3	.3	.3	.5	1.6	-
<i>Ubest.chrysophyce</i>	1.0	.3	.3	.7	.4	.3	-	-	-
<i>Uroglana americana</i>	50.6	57.7	14.3	23.5	-	-	-	-	-
Sum	194.8	168.1	108.3	106.3	37.1	57.9	31.4	34.3	-
<i>Bacillariophyceae</i> (Kiselalger)									
<i>Achnanthus sp.</i> (I=15-25)	-	-	.4	-	-	-	-	-	-
<i>Cyclotella cf.gloriosa</i>	-	-	-	1.1	2.3	1.0	.7	1.0	-
<i>Cyclotella costa</i>	-	-	.9	-	2.2	12.5	4.0	4.2	-
<i>Cyclotella sp.</i> (d=8-12,h=5-7)	-	-	-	4.8	4.8	-	3.7	-	-
<i>Diatom elongata</i>	1.0	.2	-	-	-	-	-	-	-
<i>Melosira distans v.alpigena</i>	.5	.3	.8	.3	2.3	2.5	1.2	.5	-
<i>Melosira italica</i>	.7	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Nitzschia gracilis</i>	.1	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Rhizosolenia eriensis</i>	-	-	-	-	-	.4	-	-	-
<i>Synedra sp.</i> (I=50-80)	.6	2.6	2.0	1.0	1.0	-	.1	.4	-
<i>Tabellaria flocculosa</i>	-	-	.6	-	-	-	-	-	-
Sum	2.9	3.1	4.6	7.2	12.5	16.3	9.7	6.0	-
<i>Cryptophyceae</i>									
<i>Cryptaulax vulgaris</i>	-	-	-	.3	-	-	-	-	-
<i>Cryptomonas erosa</i>	-	-	-	.2	-	.5	6.4	3.2	-
<i>Cryptomonas erosa v.reflexa</i> (Cr.refl.?)	-	-	-	-	-	.8	1.1	.8	-
<i>Cryptomonas marssonii</i>	1.2	1.1	4.1	3.6	.6	7.2	2.2	6.4	-
<i>Cryptomonas sp.</i> (I=15-18)	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-
<i>Cryptomonas sp.</i> (I=20-22)	3.2	-	-	-	-	-	3.2	-	-
<i>Cryptomonas spp.</i> (I=24-28)	6.4	2.0	1.6	4.4	1.6	4.4	4.0	3.2	-
<i>Katablepharis ovalis</i>	7.4	2.6	5.2	4.3	7.2	7.6	2.4	2.4	-
<i>Rhodomonas lacustris</i> (v.nannoplantical)	14.3	11.3	16.7	39.7	10.6	32.5	12.6	16.0	-
<i>Ubest.cryptomonade</i> (Ochromonas sp.?)	1.7	-	5.2	1.9	3.2	4.8	2.4	6.8	-
<i>Ubest.cryptomonade</i> (I=6-8) <i>Chro.acuta</i> ?	-	-	-	-	.2	.2	-	-	-
Sum	34.2	16.9	32.8	54.4	23.3	59.2	34.2	38.7	-
<i>Dinophyceae</i> (Fureflagellater)									
<i>Gymnodinium cf.lacustre</i>	1.0	1.1	1.1	1.9	2.1	8.5	.9	1.1	-
<i>Gymnodinium helicticum f.aichroum</i>	2.0	-	-	-	2.0	-	2.2	4.4	-
<i>Gymnodinium sp.</i> (I=15-18)	1.0	-	-	4.1	1.0	5.5	.9	3.1	-
<i>Gymnodinium uberrimum</i>	-	-	-	2.4	2.4	2.4	-	4.8	-
<i>Peridinium incisipuum</i>	1.0	1.6	2.4	.4	1.2	1.6	2.0	-	-
<i>Ubest.dinoflagellat</i>	.5	.5	-	2.4	1.6	-	.8	-	-
Sum	5.4	3.1	3.5	11.1	10.3	18.0	6.8	13.4	-
<i>My-alger</i>									
Sum	16.9	25.2	12.0	11.2	11.9	10.6	14.6	10.4	-
Total	257.1	219.4	166.0	194.1	103.7	173.0	105.5	107.2	-

Norsk institutt for vannforskning



NIVA

Postboks 69, 0808 Oslo

ISBN 82-577-1908-0