



O-94031

**Konsentrasjon
og transport av
fosfor i Glomma
1978 - 1993**

NIVA - RAPPORT

Norsk institutt for vannforskning  NIVA

| | |
|-------------|-----------------|
| Projektnr.: | Undernr.: |
| 94031 | |
| Løpenr.: | Begr. distrib.: |
| 3000 | |

| Hovedkontor | Sørlandsavdelingen | Østlandsavdelingen | Vestlandsavdelingen | Akvaplan-NIVA A/S |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Postboks 173, Kjelsås 0411 Oslo | Televeien 1 4890 Grimstad | Rute 866 2312 Ottestad | Thormøhlensgt 55 5008 Bergen | Søndre Tollbugate 3 9000 Tromsø |
| Telefon (47) 22 18 51 00 | Telefon (47) 37 04 30 33 | Telefon (47) 62 57 64 00 | Telefon (47) 55 32 56 40 | Telefon (47) 77 68 52 80 |
| Telefax (47) 22 18 52 00 | Telefax (47) 37 04 45 13 | Telefax (47) 62 57 66 53 | Telefax (47) 55 32 88 33 | Telefax (47) 77 68 05 09 |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Rapportens tittel: Konsentrasjon og transport av fosfor og nitrogen i Glomma 1978-1993 | Dato: 31.1. 1994 | Trykket: NIVA 1994 |
| Faggruppe: Vassdrag | | |
| Forfatter(e): Hans Holtan | Geografisk område: | |
| | Antall sider: 11 | Opplag: 45 |

| | |
|---|------------------|
| Oppdragsgiver: Statens forurensningsstilsyn | Oppdragsg. ref.: |
|---|------------------|

| |
|---|
| Ekstrakt: |
| <p>Rapporten beskriver årsverdier for konsentrasjon og transport av fosfor og nitrogen på 6 stasjoner i Glomma i tidsperioden 1978-1993.</p> |
| <p>Verdiene varierer fra år til år avhengig av variasjoner i vannføring og tilførsel av erosjonsmateriale. Resultatene tyder på at fosforverdiene har avtatt noe, mens nitrogenverdiene har holdt seg relativt konstant i de senere år.</p> |

4 emneord, norske

1. Glomma
2. Fosfor og nitrogen
3. Konsentrasjon
4. Transport

4 emneord, engelske


1. Glomma
2. Phosphor and nitrogen
3. Concentration
4. Transport

Prosjektleder



Hans Holtan

For administrasjonen



Dag Berge

ISBN-82-577-2444-0

Norsk institutt for vannforskning

O-94031

**Konsentrasjon og transport av fosfor og nitrogen i
Glomma 1978-1993**

Oslo, 31 januar 1994

Hans Holtan

Glomma. Beskrivelse av fosfor og nitrogentransport 1978 - 1993

Innledning

Denne rapport stiller sammen de midlere årsverdier samt maksimum og minimumsverdier for fosfor og nitrogen på 6 stasjoner i Glommavassdraget for tidsperioden 1978 til 1992/1993. Midlere årsvannsføring og årlige transportverdier for fosfor og nitrogen er beregnet og fremstilt i stolpediagrammer.

Arbeidet er utført som oppdrag for Statens forurensningstilsyn (SFT). Grunnlagsdataene er hentet fra diverse overvåkningsrapporter som er utarbeidet av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Avløpssambandet Nordre Øyeren (ANØ). Overvåkingen finansieres av SFT.

Målepunktene som inngår i denne utredning er:

- Bellingmo/Høyegga: Glomma like før overføring til Rendalen kraftverk.
- Skjefstadfossen: Glomma like nedstrøms Elverum.
- Funnefoss: Glomma før samløp Vorma.
- Svanfoss: Vorma nedstrøms Eidsvoll og samløp Andelva.
- Bingsfoss: Glomma oppstrøms Øyeren.
- Sarpsfoss: Glomma oppstrøms Sarpsfossen.

Mål

Hensikten med utredningen er å klargjøre i hvilken grad de iverksatte forurensningsbegrensende tiltak langs vassdraget har hatt betydning for ellevannets kvalitet, spesielt er det av interesse å finne ut om tiltak innenfor landbrukssektoren har hatt betydning. Bl. a. er fosforinnholdet i handelsgjødsel sterkt redusert i de senere år. Det er også gjennomført andre former for tiltak f. eks. redusert jordarbeiding, utbedring av silo- og gjødsellagre. Bakkeplanering er gjennomført i liten grad etter at tilskuddsordningen opphørte i 1987.

Måleprogram og metoder

Primærdataene for 1978, 1979 og 1980 er hentet fra rapporter om NIVA's Glommaundersøkelse. Siden 1981 har ANØ samlet inn og analysert prøvene fra Funnefoss, Svanfoss og Bingsfoss. På disse steder er prøvene siden 1987 blitt samlet inn med automatiske prøvetakere som ukentlige blandprøver. For 1993 foreligger det analyseresultater frem til og med november for disse stasjonene. På de øvrige stasjonene er det NIVA som har hatt ansvaret for innsamling og analysering av prøvene. Prøvene ble samlet inn manuelt. Prøvetakingsfrekvensen ved stasjonene er gitt i tabellene 1 - 6.

Selv om analysene ved begge laboratorier er utført i henhold til Norsk Standard (NS), vil ulik arbeidspraksis ved de enkelte laboratorier kunne føre til en viss usikkerhet ved tolkning av resultatene.

Vannføringsmålingene er utført av Norges vassdrags og energiverk (NVE) og av Glommen og Lågen Brukseierforening. For 1993 foreligger det ingen vannføringsdata på noen av stasjonene.

Beregning av transportverdier er i de fleste tilfeller utført i henhold til følgende beregningsmåte:

$$(\Sigma C_i * q_i / \Sigma q_i) * Q$$

hvor C_i er konsentrasjonen av fosfor/nitrogen på de enkelte prøvetakingsdager og q_i er vannføringen på de samme dager. Q er her den samlede årvannføring på de aktuelle prøvetakingsstedene. For ANØ's datamateriale som er samlet inn som ukentlige blandprøver, er analyseresultatene multiplisert med den aktuelle ukevannføring. Summen av disse resultater er da årstransporten.

Resultater og kommentarer

Generelt

Maksimum, aritmetisk middel og minimumsverdiene for fosfor og nitrogen for de enkelte årsserier er fremstilt i tabellform og som kurver. Den midlere årvannføring som m^3/s og årstransporten av fosfor og nitrogen på de ulike prøvetakingsstasjoner er fremstilt som stabler/stolpediagrammer.

Resultatene viser at det er store variasjoner både i vannføring, konsentrasjoner og transportverdier fra år til år. Maksimum- og minimums-verdiene viser at det kan være meget store variasjoner i konsentrasjonene i løpet av året. Dette gjelder alle stasjoner.

Årsaken til de store variasjoner kan skyldes flere forhold, men det antas at store variasjoner i nedbør og avrenningsforhold, er av størst betydning. F. eks. kan flomvannsføringens virkninger variere avhengig av flommenes størrelse, varighet, hyppighet og årstid. Flommene vil nemlig medføre tilførsel av erosjonsmateriale både fra nedbørfeltet og fra selve elveleiet. Dette gjelder spesielt de nedre områder hvor elven drenerer store områder med marine avsetninger (leire). I Tynset - Alvdalområdet, går elven i enkelte år over sine bredder og dette medfører tilførsler av gjødselstoffer og erosjonsmateriale fra de lavereliggende dyrkede arealer. Dette vil gi seg kraftig utslag både på konsentrasjon og transportverdier, særlig fosfor. Årsvariasjoner i den partikulære materialtransporten ved Svanfoss i Vorma og Funnefoss og Bingsfoss i Glomma, går frem av fig. 1.




Fig. 1. Årsvariasjoner i den partikulære materialtransport ved Svanfoss, Funnefoss og Bingsfoss.

Under snøsmelting og kraftig regnvær, kan tilførslene fra nedbørfeltet - både fra naturområdene og fra dyrket mark variere sterkt i løpet av kort tid. For å fange inn slike variasjoner er det nødvendig med hyppig prøvetaking. Ved transportberegninger ville registrerende observasjoner være ønskelig. Som det

går frem av tabellene har prøvetakingsfrekvensen i overvåkningsundersøkelsene variert sterkt- fra 5 til 53 prøvetakinger pr. år. P.g.a. ujevn tilførsel av erosjonsmateriale, varierer den partikulære materialtransport sterkt fra prøvetakingsdag til prøvetakingsdag. Dette betyr at fosfor som i vesentlig grad er bundet til partikler også varierer både hva konsentrasjon og transport angår. Dette gjelder alle målesteder, men er spesielt utpreget ved Bellingmo/Høyegga. Nitrogen er i mindre grad bundet til partikler og transporten av dette stoff vil derfor ikke i samme grad være influert av variasjoner i den partikulære materialtransport. Ved vurdering og sammenligning av årstransportverdiene på de enkelte stasjoner bør det tas hensyn til disse usikkerhetsmomentene. Generelt sett bør hyppige prøvetakinger gi sikrere transportverdier enn ved færre.

Figurene viser at variasjoner i vannføringen også har stor betydning for transportverdiene både for fosfor og nitrogen. Generelt sett synes det å være en viss korrelasjon mellom årsvannføring og transportverdier, særlig for nitrogen.

Forholdene ved de enkelte stasjoner

Bellingmo/Høyegga

Siden overvåkingen tok til er det bygget kloakkrenseanlegg for flere tettsteder oppstrøms prøvetakingsstedet, bl. a. Alvdal og Tynset - renseanlegget i Røros er også utbedret. Vi må anta at visse forurensningsbegrensende tiltak er gjennomført innenfor jordbrukssektoren.

Ved flomsituasjoner, særlig under snøsmeltingen om våren, kan elva på strekningen ovenfor (Tynset - Alvdal) gå over sine bredder og forårsake stor tilførsel av gjødselstoffer og partikler fra lavereliggende dyrka mark. Dette medfører høye konsentraserjoner og transport av bl. a. næringssalter. Av denne grunn er det vanskelig å vurdere om en bedring i vannkvaliteten har funnet sted selv om konsentraserjone, særlig av fosfor har avtatt i de senere år.

Skjefstadfossen

I løpet av de siste 10 - 15 år er det bygd flere kloakkrenseanlegg for tettstedene oppstrøms prøvetakingsstedet..

De foreliggende overvåkningsresultater tyder på at konsentraserjoner og transport av fosfor og nitrogen ikke har avtatt i samme periode. Eventuelle variasjoner synes å ha sammenheng med variasjoner i vannføringen.

Funnefoss

I løpet av de siste 10 - 15 år er det blitt bygd en rekke kloakkrenseanlegg for tettstedene langs Glomma oppstrøms målepunktet. Det er også blitt foretatt sanering av avløpsforholdene i områdene rundt Storsjøen i Odal. Det antas at tiltak innenfor landbrukssektoren også har hatt betydning.

Konsentraserjone og transportverdiene av fosfor og nitrogen har i de senere år (90-årene) vært av samme størrelsesorden som i slutten av 70-årene. I slutten av 80-årene var verdiene noe høyere. Dette kan skyldes høyere vannføring og større tilførsler av erosjonsmateriale enn normalt. Relativt høye maksimumsverdier tyder på det.

Svanfoss

Vannkvaliteten i Vorma er i utgangspunktet bestemt av vannkvaliteten i Mjøsa, men det lokale nedbørfeltet består av marine avsetninger (leire) som i vesentlig grad er dyrka mark, spesielt i nærområdene. Bl. a. renner Andelva sammen med Glomma oppstrøms målestedet. En må derfor forvente en betydelig tilførsel av erosjonsmateriale til vassdraget fra det lokale nedbørfelt.

I forbindelse med Mjøsaksjonen (1976 - 1980), ble det i slutten av 70-årene bygd en rekke kloakkrenseanlegg for tettstedene i Mjøsas nedbørfelt. Det samme gjelder tettstedene i Vormas lokale nedbørfelt. Dessuten ble forurensningsutslippene fra industrien sanert. Treforedlingsbedriften (Mathisen, Eidsvoll verk) ved Andelva er nedlagt. Det antas at forurensningstilførsler fra jordbruket i noen grad er redusert. Bl. a. er bakkeplaneringen redusert.

Både konsentrasjon og transport av fosfor økte fra slutten av 70-årene og frem til omkring midten av 80-årene. Fra den tid har det vært et gradvis avtak. Selv om årvannsføringen viste et tilsvarende mønster, tyder de lavere konsentrasjoner på at det har vært en reell reduksjon. Nitrogenkonsentrasjonen økte også frem mot midten av 80-årene. Siden har den holdt seg relativt konstant. Nitrogentransporten synes å variere i samsvar med variasjoner i vannføringen.

Bingsfoss

Elva oppstrøms målestedet er utsatt for tilførsler av erosjonsmateriale fra marine avsetninger som i betydelig grad er oppdyrket. Tidligere foregikk det her i betydelig grad bakkeplanering. Dette må antas innvirker på vannkvaliteten - tilførsler av erosjonsmateriale og avrenning fra jordbruksområder. Dessuten må bygging av kloakkrenseanlegg etc. antas å ha hatt betydning for vannkvaliteten.

Konsentrasjon- og transportverdiene for fosfor økte fra slutten av 70-årene frem til midten av 80-årene. Etter den tid har verdiene generelt sett avtatt, men varierer fra år til år, sannsynligvis som følge av variasjon i vannføring og tilførsel av erosjonsmateriale og avrenning fra jordbruksarealer.

Konsentrasjon- og transportverdiene for nitrogen økte også fra slutten av 70-årene og frem til omtrent midt på 80-tallet. Siden har verdiene vært relativt stabile. Visse variasjoner fra år til år gjør seg imidlertid gjeldende.

Sarpsfossen

I løpet av de siste 10 - 15 år har det også oppstrøms dette målestedet vært gjennomført forurensningsbegrensende tiltak både innenfor kloakksektoren, landbruk og industri.

Konsentrasjon og transport av fosfor var betydelig høyere på midten av 80-tallet enn på slutten av 70-årene og begynnelsen av 90-årene da de var av samme størrelsesorden. Dette variasjonsmønster har tydeligvis i vesentlig grad sammenheng med variasjon i vannføring og følgelig variasjon i tilførsel av erosjonsmateriale og avrenning fra jordbruksarealer.


Konsentrasjon og transport av nitrogen har vært av samme størrelsesorden gjennom hele perioden.

Glomma ved Bellingmo/Høyegga 1978 - 1993


Midlere årsvannføring (m³/s), konsentrasjoner (µg/l) og transport (tonn/år) av total fosfor og total nitrogen.

| | Total fosfor, µg P/l | | | Total nitrogen, µg N/l | | | Vannf. | Fosfor | Nitrogen | Antall prøver |
|------|----------------------|--------|-----|------------------------|--------|-----|--------|--------|----------|---------------|
| | Maks | Middel | Min | Maks | Middel | Min | | | | |
| 1978 | 32 | 12.7 | 6 | 250 | 186 | 150 | 79 | 23.5 | 422 | 8 |
| 1979 | 88 | 15.4 | 2.5 | 650 | 290 | 180 | 93 | 35.6 | 679 | 11 |
| 1980 | 31.5 | 8.2 | 3 | 470 | 237 | 160 | 121 | 33.9 | 935 | 12 |
| 1981 | | | | | | | 101 | | | |
| 1982 | 70 | 19 | 8.5 | 238 | 160 | 61 | 82 | 100.2 | 593 | 8 |
| 1983 | 260 | 31 | 6.5 | 417 | 191 | 105 | 100 | 290 | 772 | 12 |
| 1984 | 51.5 | 15.4 | 5 | 340 | 228 | 145 | 114 | 80.8 | 878 | 14 |
| 1985 | 123 | 23.3 | 5 | 461 | 237 | 148 | 117 | 122.8 | 915 | 15 |
| 1986 | 183 | 27.9 | 8 | 715 | 294 | 175 | 88 | 82.6 | 769 | 15 |
| 1987 | 250 | 26.7 | 5.5 | 738 | 280 | 212 | 130 | 76 | 764 | 15 |
| 1988 | 90 | 15.8 | 4 | 521 | 284 | 185 | 106 | 108 | 1038 | 14 |
| 1989 | 45 | 13.2 | 4.5 | 377 | 245 | 182 | 113.5 | 58.1 | 870.3 | 16 |
| 1990 | | | | | | | | | | |
| 1991 | 23.4 | 8.5 | 3.5 | 276 | 225 | 145 | 79.3 | 22.4 | 561 | 24 |
| 1992 | 57.9 | 11.3 | 3.2 | 409 | 228 | 139 | 100.6 | 45.7 | 734 | 26 |


Fosfor, µg P/l
Maks. Middel Min.




Nitrogen, µg N/l
Maks. Middel Min.




m³/s



Tonn P/år





Tonn N/år



Glomma ved Skjefstafoss 1978 - 1993

Midlere årsvannføring (m³/s), konsentrasjoner (µg/l) og transport (tonn/år) av total fosfor og total nitrogen.



| | Total fosfor, µg P/l | | | Total nitrogen, µg N/l | | | Vannf. | Fosfor | Nitrogen | Antall prøver |
|------|----------------------|--------|-----|------------------------|--------|-----|-------------------|-----------|-----------|---------------|
| | Maks | Middel | Min | Maks | Middel | Min | m ³ /s | Tonn P/år | Tonn N/år | |
| 1978 | 19 | 11 | 6 | 430 | 234 | 150 | 190.6 | 71.6 | 1549 | 17 |
| 1979 | 17.5 | 9 | 4 | 450 | 279 | 170 | 231.6 | 75.6 | 1046 | 7 |
| 1980 | 10 | 5.8 | 2.5 | 430 | 303 | 200 | 225 | 42.7 | 2021 | 12 |
| 1981 | | | | | | | | | | |
| 1982 | | | | | | | | | | |
| 1983 | | | | | | | | | | |
| 1984 | | | | | | | | | | |
| 1985 | | | | | | | | | | |
| 1986 | | | | | | | | | | |
| 1987 | | | | | | | 335.4 | | | |
| 1988 | 57.5 | 11.4 | 4.5 | 616 | 319 | 240 | 298.3 | 145 | 3093 | 14 |
| 1989 | 10 | 6 | 3 | 307 | 240 | 189 | 256.6 | 86.9 | 2296 | 6 |
| 1990 | | | | | | | | | | |
| 1991 | 49 | 8.6 | 4.3 | 422 | 266 | 198 | 182 | 75.1 | 1670 | 27 |
| 1992 | 29.9 | 7.7 | 3.4 | 320 | 251 | 163 | 220 | 83.1 | 1811 | 24 |



Glomma ved Funnefoss 1978 - 1993

Midlere årvannføring (m³/s), konsentrasjoner (µg/l) og transport (tonn/år) av total fosfor og total nitrogen.



| | Total fosfor, µg P/l | | | Total nitrogen, µg N/l | | | Vannf. | Fosfor | Nitrogen | Antall prøver |
|------|----------------------|--------|-----|------------------------|--------|-----|-------------------|-----------|-----------|---------------|
| | Maks | Middel | Min | Maks | Middel | Min | m ³ /s | Tonn P/år | Tonn N/år | |
| 1978 | 19 | 12 | 8 | 490 | 254 | 150 | 236 | 82 | 1766 | 9 |
| 1979 | 36.5 | 12 | 3 | 560 | 341 | 190 | 289 | 134 | 2790 | 11 |
| 1980 | 11.5 | 7.2 | 1.5 | 510 | 345 | 250 | 293 | 73 | 3043 | 12 |
| 1981 | | | | | | | 308 | | | |
| 1982 | | | | | | | 278 | | | |
| 1983 | | | | | | | 286 | | | |
| 1984 | | | | | | | 323 | | | |
| 1985 | | | | | | | 411 | | | |
| 1986 | | | | | | | 300 | | | |
| 1987 | 19.8 | 10.3 | 4.3 | 472 | 312 | 222 | 440 | 159 | 4821 | 28 |
| 1988 | 16.5 | 10 | 4 | 642 | 399 | 280 | 385 | 148 | 4456 | 29 |
| 1989 | 60 | 16 | 5 | 1100 | 399 | 240 | 330.6 | 220 | 4700 | 40 |
| 1990 | 26 | 11 | 4 | 480 | 339 | 240 | 309 | 103 | 3100 | 51 |
| 1991 | 39 | 11.5 | 4 | 650 | 354.7 | 220 | 254.1 | 117 | 2990 | 53 |
| 1992 | 34 | 7.8 | 2 | 560 | 339.2 | 220 | 280.1 | 86 | 3000 | 53 |
| 1993 | 66 | 14.3 | 4 | 830 | 356 | 210 | | | | 45 |



Glomma ved Svanfoss/Vorma 1978 - 1993

Midlere årvannføring (m³/s), konsentrasjoner (µg/l) og transport (tonn/år) av total fosfor og total nitrogen.


| | Total fosfor, µg P/l | | | Total nitrogen, µg N/l | | | Vannf. | Fosfor | Nitrogen | Antall prøver |
|------|----------------------|--------|-----|------------------------|--------|-----|-------------------|---------|----------|---------------|
| | Maks | Middel | Min | Maks | Middel | Min | m ³ /s | Tonn/år | Tonn/år | |
| 1978 | 13.4 | 9.4 | 4.1 | 740 | 502 | 345 | 267 | 79 | 4267 | 5 |
| 1979 | 16.6 | 9 | 6 | 640 | 487 | 370 | 348 | 99 | 5345 | 11 |
| 1980 | 31.5 | 16 | 11 | 685 | 470 | 370 | 305 | 154 | 4520 | 12 |
| 1981 | 44.5 | 18.2 | 7 | 715 | 480 | 355 | 310 | 178 | 4693 | 29 |
| 1982 | 44 | 15.8 | 6 | 770 | 550 | 390 | 281 | 140 | 4874 | 29 |
| 1983 | 37.5 | 15.5 | 7.5 | 1148 | 729 | 438 | 348 | 170 | 8000 | 29 |
| 1984 | 28.5 | 12.2 | 3 | 715 | 550 | 285 | 354 | 136 | 6140 | 28 |
| 1985 | 109 | 32.5 | 5 | 705 | 526 | 405 | 384 | 394 | 6370 | 30 |
| 1986 | 55 | 15.3 | 6 | 545 | 468 | 395 | 257 | 124 | 3739 | 29 |
| 1987 | 15.8 | 11.8 | 8.5 | 613 | 508 | 450 | 398 | 144 | 6300 | 29 |
| 1988 | 22.8 | 12.6 | 5 | 780 | 578 | 510 | 408 | 162 | 7437 | 29 |
| 1989 | 23 | 9 | 4 | 990 | 573 | 420 | 345.2 | 99 | 6100 | 40 |
| 1990 | 55 | 10 | 3 | 620 | 502 | 360 | 378.9 | 123 | 6000 | 51 |
| 1991 | 22 | 8 | 4 | 700 | 530 | 340 | 164.9 | 58 | 4000 | 53 |
| 1992 | 65 | 8 | 2 | 1070 | 580.8 | 450 | 303.2 | 65 | 5500 | 53 |
| 1993 | 11 | 5.3 | 2 | 880 | 564 | 380 | | | | 45 |



Glomma ved Bingsfoss 1978 - 1993

Midlere årsvannføring (m³/s), konsentrasjoner (µg/l) og transport (tonn/år) av total fosfor og total nitrogen.


| | Total fosfor, µg P/l | | | Total nitrogen µg N/l | | | Vannf. | Fosfor Tonn P/år,Tonn N/år | Nitrogen | Antall prøver |
|------|----------------------|--------|-----|-----------------------|--------|-----|--------|-------------------------------|----------|------------------|
| | Maks | Middel | Min | Maks | Middel | Min | | | | |
| 1978 | 24 | 13.1 | 7.5 | 590 | 404 | 290 | 510.1 | 223 | 6441 | 9 |
| 1979 | 37 | 14.8 | 6 | 790 | 465 | 300 | 632.7 | 287 | 7758 | 11 |
| 1980 | 14 | 8.7 | 2.5 | 510 | 455 | 380 | 596.2 | 170 | 8513 | 12 |
| 1981 | 44 | 14.9 | 7 | 640 | 396 | 260 | 598.3 | 374 | 7582 | 29 |
| 1982 | 64 | 18 | 8 | 815 | 478 | 300 | 548.9 | 357 | 8145 | 28 |
| 1983 | 42.5 | 20.8 | 7 | 790 | 531 | 340 | 620.4 | 407 | 10498 | 28 |
| 1984 | 70 | 30 | 6.5 | 905 | 480 | 280 | 674.2 | 678 | 9969 | 29 |
| 1985 | 35 | 18.4 | 6 | 640 | 444 | 350 | 809.6 | 521 | 11049 | 29 |
| 1986 | 56 | 24.3 | 6.7 | 502 | 416 | 330 | 587.8 | 450 | 7740 | 30 |
| 1987 | 26.8 | 12.6 | 7 | 624 | 444 | 360 | 857 | 387 | 11471 | 29 |
| 1988 | 19.5 | 11.4 | 5.5 | 742 | 523 | 406 | 830.4 | 316 | 13828 | 29 |
| 1989 | 61 | 10 | 4 | 1020 | 494 | 360 | 691.7 | 246 | 10500 | 40 |
| 1990 | 85 | 20 | 4 | 770 | 484 | 360 | 728.9 | 518 | 10800 | 51 |
| 1991 | 59 | 13.6 | 5 | 750 | 501.1 | 340 | 493.5 | 242 | 8160 | 53 |
| 1992 | 53 | 12 | 3 | 1000 | 521.2 | 390 | 596.7 | 275 | 9600 | 53 |
| 1993 | 57 | 15 | 5 | 730 | 531.3 | 340 | | | | 45 |



Glomma ved Sarpsfoss 1978 - 1993

Midlere årvannføring (m³/s), konsentrasjoner (µg/l) og transport (tonn/år) av total fosfor og total nitrogen.

| | Total fosfor, µg P/l | | | Total nitrogen, µg N/l | | | Vannf. | Fosfor | Nitrogen | Antall prøver |
|------|----------------------|--------|-----|------------------------|--------|-----|-------------------|-----------|-----------|---------------|
| | Maks | Middel | Min | Maks | Middel | Min | m ³ /s | Tonn P/år | Tonn N/år | |
| 1978 | | 20 | 14 | 790 | 487 | 303 | 586 | 415 | 9767 | 35 |
| 1979 | 31.3 | 20.5 | 11 | 1090 | 598 | 363 | 731 | 452 | 12908 | 48 |
| 1980 | 45.2 | 20.1 | 9.2 | 822 | 568 | 373 | 692 | 408 | 11984 | 48 |
| 1981 | 37.6 | 18.5 | 8.5 | 868 | 579 | 390 | 692 | 367 | 12194 | 29 |
| 1982 | 34.5 | 17 | 7.8 | 840 | 566 | 400 | 656 | 376 | 12259 | 25 |
| 1983 | 36 | 17.7 | 11 | 895 | 541 | 408 | 720 | 702 | 12897 | 35 |
| 1984 | | | | | | | | | | |
| 1985 | | | | | | | | 684 | | |
| 1986 | 125.4 | 37.5 | 7.9 | 923 | 626 | 387 | 658 | 773 | 11574 | 25 |
| 1987 | 55.5 | 22.2 | 6 | 950 | 579 | 390 | 952 | 702 | 15044 | 24 |
| 1988 | 54.4 | 24 | 8 | 851 | 550 | 406 | 922 | | 15308 | 24 |
| 1989 | | | | | | | | | | |
| 1990 | 100 | 18 | 6 | 774 | 476 | 321 | 745.5 | 418 | 10718 | 16 |
| 1991 | 171 | 23.7 | 5 | 1200 | 600 | 330 | 562.4 | 401 | 10398 | 18 |
| 1992 | 77 | 21.6 | 5 | 1460 | 612 | 314 | 630 | 417 | 11497 | 18 |
| 1993 | | | | | | | | | | |





Norsk institutt for vannforskning

Postboks 173 Kjelsås, 0411 Oslo

Teléfono: 22 18 51 00 Fax: 22 18 52 00

ISBN 82-577-2444-0